

Über die
Gewichtsverhältnisse der Milz
bei verschiedenen Krankheiten.

Inaugural-Dissertation
zur
Erlangung der Doctorwürde
in der

Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe

einer hohen

medizinischen Facultät

der

kgl. Ludwig-Maximilians-Universität in München

unter dem Präsidium des

Herrn Professor Dr. O. Bollinger

Conservator des pathologischen Instituts

vorgelegt von

Vincent Prenner

pract. Arzt aus Gangkofen.

München, 1885.

Kgl. Hof- & Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.

Über die
Gewichtsverhältnisse der Milz
bei verschiedenen Krankheiten.

Inaugural-Dissertation
zur
Erlangung der Doctorwürde
in der
Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe
einer hohen
medizinischen Facultät
der
kgl. Ludwig-Maximilians-Universität in München.

unter dem Präsidium des
Herrn Professor Dr. O. Bollinger
Conservator des pathologischen Instituts

vorgelegt von
Vincent Prenner
pract. Arzt aus Gangkofen.

München, 1885.

Kgl. Hof- & Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.

Digitized by the Internet Archive
in 2026

Im Jahre 1883 behandelte Dr. Eberhard Gocke prakt. Arzt in Paderborn die Gewichtsverhältnisse normaler menschlicher Organe als Thema für seine Inaugural-Dissertation. Neben den übrigen Organen verbreitet derselbe sich selbstredend auch über das Normalgewicht der Milz. Er zeigt wie von verschiedenen Beobachtern stets verschiedene Gewichte als die normalen für die menschliche Milz bezeichnet wurde; so differiren Krause, Sappey, Gluge, Blossfeld und Andere sämmtlich in ihren Gewichtsangaben. Herr Gocke hat nun auf Grund seiner statistischen Zusammenstellung normaler Milzgewichte, welcher Bearbeitung Sectionen des pathologischen Institutes zu München zu Grunde lagen, das Normal-Gewicht für die Milz bei Männern mit einem mittleren Körpergewichte von 59 Kilogramm auf 161 gramm und bei Frauen mit einem durchschnittlichen Körpervolumen von 47 Kilo auf 167 gramm festgesetzt. Obiger Arbeit gegenüber mache ich nun den Versuch einige Durchschnittszahlen für pathologisch veränderte Milzen aufzustellen. Selten bekommen wir bei unseren Sectionen normale menschliche Organe zur Ansicht; mehr oder minder sind sie krankhaft verändert. Auch den Praktiker interessiren die Grössenverhältnisse der einzelnen Organe; geben doch sie demselben einzig oft am Krankenbette den erwünschten Aufschluss oder sind sie ihm doch wenigstens oft der Schlüssel zu weiteren Folgerungen

Insbesondere ist es für den Praktiker die Milz, über deren Grössenverhältniss sich derselbe in einzelnen Krankheitsfällen in erster Linie informirt, denn die Erfahrung hat ihn belehrt, dass bei einer grossen Anzahl von Krankheiten, mit oft sehr verschiedenem Charakter, stets die Milz in ihrem Volumen eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt. Die Milz, die topographisch ebenso eigentümlich gelagert ist, als ihr histologischer Bau seine Eigentümlichkeit hat, zeigt oft in überraschender Weise eine Vergrösserung ihres Volumens. Und fragen wir uns, warum bei so manigfachen Erkrankungen mit präziser Regelmässigkeit stets mehr oder minder Milztumor im Gefolge sehen, so gibt darauf Prof. Dr. N. Friedreich in seinem Vortrage über den acuten Milztumor (Volkmanns Vorträge Nr. 75) den besten Aufschluss, indem er sagt: «Die Milz ist ein Organ, das aus in besonders hohem Grade erregbaren Elementen zusammengefügt ist, das auch auf den leisesten Reiz durch Hyperplasie seiner pulpösen Elemente reagirt.» Nun aber werden wir weiter folgern, ist diese Milzschwellung eine Krankheit für sich i. e. ist sie primärer oder nur secundärer Natur? Die klinischen Erfahrungen lehren uns, dass die Milz an und für sich eine äusserst geringe Tendenz zur selbständigen Erkrankung hat, was wohl aus dem histologischen Baue des Organs resultiren dürfte. Milztumoren beruhend auf primärer Milzerkrankung sind sporadisch, und selbst manche von jenen Fällen, die man zu den primären rechnete, wie z. B. Ecchinoccen der Milz, die Malariainfektion, die Hodgkin'sche Krankheit etc., zeigen bei genauer, allseitiger Untersuchung meist in erster Linie eine Erkrankung des Blutes. In dieser Richtung drückt sich Friedreich in demselben Vortrage folgendermassen aus: «Insbesondere zeigt sich Reiz der Milz auf Schädlichkeiten, die im Blute enthalten sind wie bei den Infectionskrankheiten» und erklärt dies eben auch aus dem Baue der Milz. Der Milzparenchym, behauptet er, habe eine besondere Empfindlichkeit für die im Blute

circulirenden Infectionsstoffe.» So treffen wir auch am Krankenbette mit seltenen Ausnahmen, bei allen rein infectiösen Krankheiten wie insbesondere Diphtherie, Pocken, Puerperalfieber, Pyaemie, Erysipelas, Wechselfieber etc. stets Milzschwellung im grösseren oder geringeren Massstabe. Wir nennen diesen den acuten Milztumor. Ihm gegenüber steht der chronische Milztumor und theilen wir sonach die Tumoren der Milz in acute und chronische, als Hauptrepräsentanten, ganz abgesehen von jenem physiologischen Milztumor, der sich täglich nach der Mahlzeit im Verdauungsstadium zu zeigen pflegt. Pfllegt der acute Tumor mit den infectiösen Krankheitsformen plötzlich aufzutreten, rasch sich auszubreiten, um dann mit oder doch unmittelbar nach jenen Krankheiten wieder sich zurückzubilden, so trägt der chronische Milztumor den Stempel der stationären Abnormität an sich. Wenn Virchow den acuten Tumor als parenchymatöse Entzündung bezeichnet, so müssen wir bei dem chronischen Milztumor die Mehrbetheiligung der bindegewebigen Elemente in den Vordergrund stellen. Was nun die Entstehungsart der acuten Milzschwellung anlangt, so bestanden darüber vielfache Meinungen und haben bedeutende Männer wie Birch-Hirschfeld, Davaine, Obermeier und insbesondere Ponfick sich mit dieser Aufgabe beschäftigt. Sie haben versucht separat für die einzelnen Krankheitsformen wie bei Typhus abdominalis, bei Thyphus recurrens, Pyaemie, Diphtherie die Genesis der Milzschwellung zu ergründen und all ihre Forschungen und Resultate zielen darauf hinaus, dass die Ursache i. e. der Erreger dem Blute beigemischt sei und von da aus dem Organe zugeführt werde. Hinsichtlich des acuten Tumors nimmt Ponfick an, dass sich die Schwellung der Milzpulpa aus 2 Factoren zusammensetze, nemlich fürs Erste, aus starker Gefässschwellung und für's Zweite dann aus einer übergrossen Vermehrung der zelligen Elemente. Diese Ansicht stimmt mit der Behauptung Birch-Hirschfeld's überein, der in

seinen Untersuchungen zeigt, dass die Mikrokokken bei Infektionskrankheiten gerade in der Milz sich besonders ansammeln und sogar theilweise von den Pulpazellen und ihrem Protoplasma aufgenommen und zurückgehalten werden. Dieser Anschauung steht scheinbar der Fall gegenüber, dass ja auch infectiöse Krankheiten sich abwickeln ohne nachweisbaren Milztumor. Dies trifft jedoch nur meist bei ganz rapid verlaufenden Fällen zu, und ist hiebei anzunehmen, dass das Individuum zu Grunde ging bevor Mikrokokken in solch' grosser Anzahl in's Blut übergegangen und von der Pulpa aufgenommen waren, dass man eine grössere Milzschwellung constatiren konnte. Dieser rapiden Entwicklung des acuten Milztumors, steht die Entwicklung des chronischen gegenüber. Bei ihm ist entsprechend dem zu Grunde liegenden Allgemein- oder chronischen-Leiden der Verlauf hinsichtlich der Dauer ein sehr gedehnter und verschiedener. Wir können seinen Zustand als einen ziemlich vorgeschrittenen bezeichnen, wenn uns das Symptom die Kachexia splenica et lymphatica — wie diese charakteristische Störung des Allgemeinbefindens von Mosler in seiner Abhandlung über die Krankheiten der Milz genannt wird — entgegentritt. Allein nicht nur die Milz ausschliesslich, sondern auch die Lymphdrüsen insgesamt finden wir bei dem chronischen Milztumor alterirt. Sehen wir nun bei den infectiösen, acuten und chronischen Leiden fast immer als Begleiterscheinung den Milztumor, so drängt sich uns die Frage noch auf, ob denn beide Geschlechter in gleich häufiger Weise davon heimgesucht werden oder welches überwiegend ist; ebenso ob vielleicht ein gewisses Lebensalter eine Art von Immunität aufweise. Was den letzten Punkt anlangt, so ist die Antwort ebenso sicher negativ als hinsichtlich der Geschlechter allgemein die Ansicht besteht, dass wir den Milztumoren beim männlichen Geschlechte in überwiegender Anzahl begegnen. Der Grund hiefür liegt ziemlich nahe. Ist doch die Beschäftigung des Mannes im

Grossen und Ganzen vorwiegend ausser dem Hause und ist derselbe somit allen klimatischen Einflüssen und Unbilden in höherem Grade ausgesetzt als das weibliche Geschlecht, dessen Wirkungskreis zumeist der geschlossene Raum ist. Nicht zu übersehen ist dabei auch die meist ungleich grössere und anstrengendere Muskelarbeit des Mannes bei vielleicht gleich schlechtem Ernährungs- und Bekleidungs-Material.

Nach dem nun Vorausgeschickten sind wir uns auch darüber klar, dass nicht alle Milztumoren ein und denselben Höhengrad erreichen, dass vielmehr diese oder jene Krankheitsgruppe das Maximum oder Minimum der Milzschwellung aufweisen wird. Und da es nun nicht ganz Interesselos sein dürfte, bei den verschiedenen Krankheitsgruppen für den zutreffenden Milztumor eine Durchschnittszahl festzustellen und bisher diesbezüglich — soviel wenigstens mir bekannt — nur von Birch-Hirschfeld für XIII spezielle Krankheitsformen Durchschnittsgewichte für den Milztumor bestimmt wurden, wobei jedoch eine nur kleine Anzahl von Fällen und ohne Ausscheidung nach Geschlecht in Betracht gezogen wurde, so habe ich den Versuch gewagt aus 1000 Sectionen von Erwachsenen und 150 Obductionen von Kindern diesbezügliche Mittelzahlen für beide Geschlechter aufzufinden. Die Grundgedanken und die Richtschnur, nach denen diese Bearbeitung ausgeführt wurde, erlaube ich mir in Kürze hier auseinanderzusetzen.

Als Material wurden die Sectionen des pathologischen Institutes zu München benützt, für deren gütige Ueberlassung Herrn Prof. Dr. von Bollinger, Director des pathologischen Institutes dahier, meinen wärmsten Dank auszusprechen mir erlaubt sei. Es kamen in Verarbeitung die Obductionen aus den Jahren 1883, 84 und theilweise 85. Natürlich konnten nur jene Sectionen Beobachtung finden, bei denen Körper und Milzgewicht genau verzeichnet waren. Im Ganzen stellte ich wie oben erwähnt die Sectionen von 1000 Erwachsenen

und 150 Kindern zusammen. Was die Ausscheidung betrifft, so wurden in erster Linie die beiden Geschlechter getrennt behandelt, ebenso gesondert die Sectionen der Kinder.

Berücksichtigung bei Anlage der Tabelle fanden:

- 1) Körpergewicht,
- 2) Milzvolumen,
- 3) Pathologisch-anatomischer Krankheitsbefund.

Was nun die Ausscheidung der einzelnen Fälle betrifft, so wurde in IV grosse Gruppen, denen als V die Kinder angehängt wurden, gesondert nemlich:

I. Infectiouskrankheiten, d. h. Krankheiten von zweifellos infectiösen Charakter.

II. Acute Formen, d. h. nicht unter I fallende Krankheiten, über deren Charakter zu reden mir später erlaubt sei.

III. Chronische Leiden.

IV. Gewaltsame Todesarten, Selbstmord.

Ausserdem bemerke ich noch zur Technik, dass jedem einzelnen Falle die laufende Nummer des Sectionsprotokolls des Institutes beigelegt wurde, sowie auch die einzelnen Jahrgänge äusserlich von einander kenntlich gemacht wurden, um im Bedarfsfall einen einzelnen Fall leichter nachsehen zu können. Ehe ich nun auf die Betrachtung der Sectionen eingehe, muss ich noch hinsichtlich des Milzgewichtes erwähnen, dass sämtliche Milzen als sie gewogen wurden gemäss dem Gebrauche des Institutes der Länge nach gespalten waren — eine Gewichtsbeeinflussung, die kaum den Werth von 2—5 gramm im einzelnen Falle überschreiten und somit auch keinen besonderen Ausschlag geben dürfte.

1000 Sectionen von Erwachsenen vertheilen sich auf die IV angezeigten Gruppen:

Es treffen auf:	Männlich	Weiblich	Totalsumme
I. Infectiouskrankheiten	24	43	67
II. Acute Krankheitsformen	194	117	311
III. Chronische Leiden	354	236	590
IV. Gewaltsame Todesart	24	8	32
Summa	596	404	1000

Von den 150 Kindersectionen treffen auf:

	Männlich	Weiblich	Totalsumme
I. Infectiouskrankheiten	30	29	59
II. Acute Krankheitsformen	31	41	73
III. Chronische Leiden	9	9	18
Summa	71	79	150

ad. I Infectiouskrankheiten.

Unter diese Rubrik wurden nur jene Krankheitsformen aufgenommen, die von der ganzen medizinischen Welt als rein infectiös angenommen werden. Die zusammengestellten 24 männlichen Fälle ergeben als Durchschnittszahl ein Körpergewicht von 53,27 Kilo mit einem Milzgewichte von 305,0 Gramm; die Grenzen, aus denen diese Mittelzahl berechnet wurde, sind bei 70 Kilo Körper = 100 gr. Milzgewicht als Minimum und bei 48 Kilo Körper = 700 gr. Milzgewicht als Maximal-Satz.

Die 43 weiblichen Fälle ergeben als Durchschnittszahl als Körpergewicht 47,63 Kilo und 250,8 gramm Milzgewicht, wobei 43 Kilo Körpergewicht, 55 gramm Milzgewicht die Minimal- und 43 Kilo Körper-, 760 gr. Milzgewicht die Maximal-Grenze ist.

Um aus dieser grossen Gruppe eine spezielle Krankheitsform einzeln zu betrachten, habe ich für den Typhus abdominalis, seiner Beziehung zur Milz halber, noch separat die Mittelzahl berechnet.

Männlicherseits ergaben die 4 Typhusfälle ein mittleres Körpergewicht von 53,38 Kilo, sowie ein mittleres Milzgewicht von 493,75 gramm.

Weiblicherseits kamen 13 Fälle in Betracht und ergaben ein Durchschnittsgewicht von 45,73 Kilo für den Körper und 278,4 gramm für die Milz.

II. Die acuten Krankheitsformen.

Bevor ich hier über die Milzverhältnisse im Allgemeinen spreche, sei mir erlaubt über die Zusammstellung dieser

Gruppe Einiges vor auszuschicken. Schon bei der I. Gruppe habe ich den Zusatz «Krankheiten vom strengsten rein-infectiösen Charakter» in Rücksicht auf diese II. Classe gemacht. Liegen doch die Anhänger der älteren medizinischen Schule immer noch im Streite mit den Anschauungen unserer neuen pathologischen Forschern. Seitdem vielfach und von vielen tonangebenden Pathologen der Pneumococcus bei Pneumonia crouposa nachgewiesen wurde, rechnet die jetzige Pathologie die croupöse Pneumonie unstreitig zu den Krankheiten infectiösen Charakters. Um jedoch auch der älteren Richtung, die daran festhält, dass eine croupöse Pneumonie auch auf irgend ein Nocens hin sich entwickeln könne, Rechnung zu tragen, habe ich die croupöse Pneumonie unter die Gruppe der acuten Krankheiten gestellt, dieselbe jedoch für sich separat berechnet und für die croupöse Pneumonie bei Männern in 30 Fällen das mittlere Körpergewicht von 50,3 Kilo und ein mittleres Milzgewicht von 210,7 gramm gefunden.

Bei den Frauen ergaben sich für die croupöse Pneumonie aus 22 Fällen die Durchschnittszahlen 47 Kilo Körpergewicht mit 190,7 gr. Milzgewicht.

Was die übrigen acuten Krankheiten anlangt, so lieferten die 164 berechneten männlichen Fälle: 55,7 Kilo für den Körper und 229,8 gr. für die Milz als Durchschnittszahlen.

Aus den nach Abzug der croupösen Pneumonie restirenden 95 weiblichen Fällen ergeben sich als Mittelzahlen: 44,5 Kilo für den Körper und 160 gr. für die Milz.

III. Die chronischen Leiden.

Von dieser Categorie wurden 590 zusammengefasst und zwar 354 männliche und 236 weibliche Nummer. Es wurde in erster Linie eine Mittelzahl aus sämtlichen chronischen männlichen Fällen, sowie sämtlichen weiblichen Fällen gezogen und ergab sich, dass für die chronischen Krankheiten in ihrer Gesammtheit ein durchschnittliches Körpergewicht

von 50,3 Kilo sowie ein durchschnittliches Milzgewicht von 220,6 gr für den Mann trifft.

Dem stehen gegenüber ein durchschnittl. Körpergewicht von 43 Kilo und ein durchsch. Milzgewicht von 160,5 gramm bei den Frauen.

Dass die Ziffern für das Milzgewicht im Verhältniss zur Körperschwere etwas erhöht sind, dürfte schliesslich daraus resultiren, dass sich sowohl männlicher- als auch weiblicherseits 2 Fälle von enormem Milzgewichte finden.

Es ist dies unter den männlichen Fällen Nr. 98 des Sectionsjournals vom Jahrgang 1883 K. J. 47 Kilo 1105 gr Milzgewicht mit der pathol. anatomischen Diagnose: Lienale, lymphat. myelogene Leukaemie.

Die Milzvolumina sind $23 \times 14 \times 5 \times 8,0$.

Bei den Frauen ist Nr. 335 vom Jahrgange 1884. M. Th. 44½ K. 1800 gr. Milzgewicht mit eben der Diagnose Lienale, lymph. myelogene Leukaemie.

Die Milzvolumina sind in diesem Falle: $26,5 \times 15,6 \times 5,2$.

Diese beiden gewaltigen Milztumoren dürften wohl bei Betrachtung obiger Durchschnittszahlen nicht ausser Acht gelassen werden.

Schliessen wir diese 2 enorm grossen Zahlen, da sie ja sehr selten sich finden, so unter 1000 Sectionen nur 2 mal, aus der Berechnung d. h. aus der Betrachtung sämtlicher chronischer Leiden im Allgemeinen aus, so erhalten wir für die chronischen Fälle als Mittelzahlen beim Manne: 50,33 Kilo Körper- und 218 gr Milzgewicht, beim Weibe: 42,9 Kilo Körper- und 153,5 gr. Milz-Gewicht.

Um nun aus der ja so zahlreichen Gruppe der chronischen Leiden eines speziell zu behandeln, habe ich die Phthisis herausgegriffen. Fürs Erste ihrer grossen Bedeutung und Verbreitung halber, fürs zweite weil sie unter den obducirten 354 männlichen Fällen 196 mal, unter den 236 weiblichen Fällen 78 mal zu finden ist.

Für die Phtisis pulmon. (combinat.) ergaben sich aus den genannten Fällen: Beim Manne 46,2 Kilo Körper- und 214 gr Milz-Gewicht als Durchschnittszahlen. Bei der Frau: 37,7 Kilo Körper- und 168 gramm Milz-Gewicht.

IV. Gewaltsame Todesarten. (Selbstmord.)

Diese Gruppe wurde mit in Verarbeitung gezogen, um neben den pathologischen Milzverhältnissen auch einige Zahlen normaler i. e. nicht durch Krankheiten veränderter Milzen zum Vergleiche zu haben.

Es ergaben die 24 Sectionen männlicherseits als Durchschnittsgewicht 63,7 Kilo Körper- und 160,8 gramm Milz-gewicht.

Die obducirten 8 weiblichen Fälle liefern als Durchschnittsgewicht 49,12 Kilo Körper- und 148,0 gramm Milz-gewicht.

Zusammenstellung der Ergebnisse aus genannten 1000 Sectionen:

Männlich.

I. Infectiouskrankheiten:

- a) Im Allgemeinen: Körpergewicht 53,27 K. Milz 305,0 gr.
- b) Spez. Fall Typh.
 abebmin. ,, 53,38 K. ,, 493,7 gr.

II. Acute Krankheiten:

- a) Pneumon. croupos: Körpergew. 50,3 K. Milzg. 210,7 gr.
- b) Die übrigen Fälle: ,, 55,7 K. ,, 229,8 gr.

III. Chronische Leiden:

- a) Im Allgemeinen: Körpergew. 50,3 K. Milz 220,6 gr.
- b) Allgemein nach Abzug von Leu-
 kaemie: 50,33 K. ,, 218 gr.
- c) Phthis. pulmon: 46,2 K. ,, 214 gr.

VI. Gewaltsame Todesart:

Körpergewicht 63,7 K. Milzgew. 160,8 gr.

Weiblich.**I. Infectiouskrankheiten:**

- a) Im Allgemeinen: Körpergewicht 47,6 K. Milzg. 250,8 gr.
 b) Typh. abdominal „ 45,7 K. „ 278,4 gr.

II. Acute Krankheiten:

- a) Pneumon. croupos: Körpergew. 47 K. Milzg. 190,6 gr.
 b) Die übrigen Fälle: „ 44,5 K. „ 160,0 gr.

III. Chronische Leiden:

- a) Allgemein: Körpergewicht 43 K. Milz 160,5 gr.
 b) nach Abzug von Leukaemie:
 Körpergewicht 42,9 K. „ 153,5 gr.
 c) Phthis. pulmon. „ 37,0 K. „ 168,0 gr.

IV. Gewaltsame Todesart:

Körpergewicht 49,12 K. Milz 148 gr.

Die untersuchten 150 Sectionen von Kind ergaben als Durchschnittszahlen:

Männlich.**I. Infectiouskrankheiten.**

Körpergewicht 11 K. Milzgew. 59 gr.

II. Acute Krankheiten:

Körpergew. 11,6 K. Milz 69 gr.

III. Chronische Leiden.

Körpergew. 13,5 K. Milz 66,7 gr.

Weiblich.**I. Infectiouskrankheiten:**

Körpergewicht 11,2 K. Milz 58 gr.

II. Acute Krankheiten.

Körpergew. 12,7 K. Milz 50,8 gr.

III. Chronische Leiden.

Körpergew. 9,8 K. Milz 54 gr.

Diese Uebersichtszusammenstellung lässt nun erkennen, dass wir bei beiden Geschlechtern die höchste Durchschnittszahl für patholog. Milz bei den Infectionskrankheiten haben, wobei jedoch das Körpergewicht nahezu normal ist. Die acuten Krankheitsformen weisen bei subnormalem Körpergewicht, insbesondere männlicherseits einen ziemlichen Milztumor auf. Was die chronischen Leiden betrifft, so finden wir männlicherseits starken Milztumor mit subnormalem Körpergewicht, während weiblicherseits bei ebenfalls subnormalem Körpergewicht die Milz nahezu das Normalgewicht aufweist. Was die IV. Gruppe betrifft, welche gewissermassen nur als Vergleichspunkt in Betracht gezogen wurde, haben sich sowohl hinsichtlich des Milz- als auch des Körper Gewichts übereinstimmende Resultate mit der Arbeit des Herrn Collega Gocke gefunden. Was den Milztumor bei den Kindern betrifft, so wird er im Allgemeinen am häufigsten bei hereditärer Syphilis gefunden. Dr. Gee fand in einem Viertel aller untersuchten Fälle, Geheimrath v. Hecker unter 17 Fällen von Lues congenit. 5 mal die Milz vergrössert. Von Eisen-schnitz wird der Milztumor bei Kindern sogar als diagnostisches Moment für hereditäre Syphilis dargestellt.

Bei den von mir untersuchten 150 Kindersectionen zeigten sich keine besonders grossen Gewichtsunterschiede, was zum Theile daraus erhellt, dass fürs Erste das Alter der Kinder zwischen 1—12 Jahren und somit das Körpergewicht auch zu sehr differirt, anderseits aber auch daraus, dass die untersuchten 150 Fälle auch eine sehr bescheidene Summe sind und für einen derartigen Versuch nicht ausreichend sein dürften.

Tabellen.

Sectionen aus dem Jahre 1883.

I. Infections

M ä n n l i c h.

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1883.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht	Milz- volumen	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
8.	B. Fd. 3 J.	70 Kilo	100 gr.	Septicaemie.
209.	L. M. 27 »	67 »	175 »	Diphtherie.
277.	St. J. 58 »	59 »	160 »	Diphther. pharynget. larynx.
287.	S. M. 33 »	42 »	280 »	Septicaemie.
336.	D. P. 27 »	51 »	230 »	Typhus abdomin. (II. Woche).
371.	N. J. 45 »	43 ¹ / ₂ »	245 »	Sepsis, jauchige Phlegmone.
466.	A. V. 30 »	61 ¹ / ₂ »	475 »	Typh. abdom. fud der 4. Woche.
512.	K. Gg. 55 »	65 »	130 »	Sepsis post flaua.
518.	W. J. 29 »	48 »	700 »	Typh. abdom. IV. Woche.
534.	G. M. 15 »	41 »	340 »	Septicopyaemie, Leberabscess.
558.	H. J. 26 »	62 »	180 »	Sepsis e vulner.
584.	A. Chr. 61 »	44 ¹ / ₂ »	190 »	Septicaemie et Uraemie.
590.	B. Fr. 40 »	61 »	190 »	Septicaemie.
608.	Sp. P. 48 »	57 ¹ / ₂ »	400 »	Septicopyaemie, Gangraen der untern Extrem.
610.	M. J. 42 »	42 »	450 »	Pyemie. Traum. patell.

Gemacht im pathol. Institute zu München.
krankheiten.

W e i b l i c h .

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1883.	Name und Alter des Secirten.	Körper- gewicht	Milz- volumen	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
1.	H. Fl. 21 J.	51 Kilo	290 gr.	Metritis puerperal. Peritonit.
14.	H. Cr. 38 »	54 »	160 »	Peritonit. purulent ex abort.
66.	N. M. 34 »	37 »	550 »	Interstitielle Hepatit. syphilitic.
112.	L. Cr. 46 »	67 $\frac{1}{2}$ »	125 »	Septicaemie post Exstirpat. mammarum.
148.	Sch. A. 29 »	58 »	355 »	Typh. abdominal.
171.	D. K. 21 »	49 »	200 »	Endometrit. et. Metrit. puerper.
239.	Sch. B. 24 »	39 $\frac{1}{2}$ »	210 »	Septicaem. puerperal.
291.	B. M. 25 »	47 »	375 »	Typh. abdominal.
319.	H. J. 32 »	55 »	400 »	Typh. abdom. (IV. Woche).
325.	K. M. 30 »	43 »	760 »	Endometrit puerperal. Abortus im 3. Monat.
356.	B. B. 25 »	46 »	90 »	Sepsis puerperal.
373.	L. Fl. 24 »	50 »	280 »	Typh. abdom. Aufg. d. II. W.
421.	O. K. 20 »	62 »	440 »	Sepsis e phlegm. purulent.
455.	J. Fr. 25 »	43 »	260 »	Endometrit. puerperal.
462.	Sch. B. 26 »	38 $\frac{1}{2}$ »	215 »	Typh. abdominal.
464.	B. Th. 27 »	43 »	115 »	Sepsis post operationem.
481.	Z. B. 15 »	53 $\frac{1}{2}$ »	250 »	Scarlatina. Katarrh. Pneumon.
493.	B. J. 14 »	30 $\frac{1}{2}$ »	335 »	Typh. abdom. Mitte d. I. W.
513.	H. C. 20 »	48 »	210 »	Typh. abdom. Ende d. III. W.
540.	K. M. 20 »	48 $\frac{1}{2}$ »	310 »	Typh. abdom. III. Woche.
548.	E. M. 21 »	36 »	204 »	Typh. abdom. IV. Woche.
555.	B. Fl. 37 »	49 $\frac{1}{2}$ »	210 »	Puerperal. Septico-Pyaemie.
564.	W. R. 22 »	61 »	320 »	Typh. abdom. Ende d. III. W.
566.	D. A. 17 »	35 »	165 »	Ileo-Colontyph. IV. Woche.
625.	L. Th. 54 »	44 »	175 »	Lues inveterat. Speck-Niere- Leber-Milz.
628.	A. R. 40 »	53 $\frac{1}{2}$ »	110 »	Septicaemie post Ovariectom.
637.	Sch. A. 70 »	39 »	90 »	Septico-Pyaemie.

Die Sectionen des pathol. Institutes

I. Infections

M ä n n l i c h.

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1884.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht	Milz- volumen	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
4.	U. G. 41 J.	78 $\frac{1}{2}$ K.	315 gr.	Septicopyaemie post fract. colli humeri.
70.	Z. M. 44 »	51 »	190 »	Septicaemie.
89.	H. J. 26 »	31 »	245 »	Septicopyaemie.
193.	K. L. 50 »	51 »	680 »	Lues. Syphilit. Gummata. Stauungsmilz.
298.	Sp. Fr. 24 »	63 »	565 »	Septicaemie e vulner. Milz- und Leber-Schwellg.
530.	H. Gg. 30 »	53 »	570 »	Typh. abdomin. IV. Woche.

Sectionen aus

41.	H. C.	46 J.	55 Kilo	200 gr.	Septico-Pyaemie.	Erfrierung d. Füße.
87.	St. A.	17 »	22 »	175 »	Allgemeine Lues.	
88.	M. E.	34 »	59 »	185 »	Septicaemie.	

zu München im Jahre 1884.

krankheiten.

W e i b l i c h .

Fortlauf. Nr. des Sections- berichtes 1884.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht	Milz- volumen	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
106.	St. M. 30 J.	52 Kilo	640 gr.	Endometrit. puerperal. septic. Infarcte in Milz.
114.	Sch. R. 38 »	40 »	240 »	Septicopyaemia puerperalis.
122.	F. M. 23 »	67 »	200 »	Septicopyaemia puerperalis.
135.	P. Cr. 38 »	39 »	90 »	Septicaemie post Laparotomie. Anaemie.
256.	S. L. 16 »	35 »	100 »	Embol. Septicopyaemie mit Thrombophlebitis.
283.	G. F. 52 »	54 »	150 »	Septicaemie post Laparotomie.
304.	Gl. A. 29 »	42 »	160 »	Septicaemie. Phlegmon. purul.
360.	M. M. 17 »	43 »	170 »	Ileotyphusabdom. Aufg. III. W.
361.	Gl. J. 41 »	53 »	210 »	Peritonit. puerperalis. Metro- lymphangitis.
467.	G. Th. 28 »	52 »	220 »	Septicaem. Endom. puerperal.
512.	H. A. 44 »	44 »	280 »	Typh. abdomin. IV. Woche.
518.	Sp. Cr. 33 »	45 »	300 »	Endometrit. Diphther. puerperal.
523.	E. M. 38 »	51 »	330 »	Pyemia chron. puerperal.

dem Jahre 1885.

29.	G. A. 42 J.	52 Kilo	160 gr.	Sepsis post Ovariectomiam.
56.	G. A. 64 »	43 »	55 »	Sepsis post Ovariectomiam.
115.	B. M. 64 »	48 $\frac{1}{2}$ »	275 »	Septicopyaemie. Jauchiger Decubitus.

Sectionen aus dem Jahre 1883.

II. Acute nicht

M ä n n l i c h.

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1883.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht	Milz- volumen	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
4.	H. Al. 36 J.	43 Kilo	275 gr.	Pleurit. exsudat. Tuberkulos.
19.	S. K. 51 »	47 $\frac{1}{2}$ »	90 »	Pericardit. haemorrhag. Cor- adipos.
37.	Sp. Gg. 64 »	55 $\frac{1}{2}$ »	140 »	Pericardit. haemorrhag. Bronchitis.
38.	K. Jos. 30 »	65 $\frac{1}{2}$ »	175 »	Fissura bas. cranii. Comot. cerebr.
44.	B. Fr. 31 »	76 »	185 »	Peritonitis e resection. Ilei.
51.	H. Hg. 55 »	59 »	285 »	Pleuropneumonie.
52.	L. Seb. 71 »	55 $\frac{1}{2}$ »	145 »	Pleuropneumonie.
55.	G. M. 48 »	43 »	190 »	Peribronchitis nodos et purul.
61.	P. Fr. 50 »	74 »	255 »	Apoplex. cerebr. Atheromatos.
62.	Sch. H. 27 »	56 $\frac{1}{2}$ »	170 »	Apoplex. cerebr.
65.	P. M. 72 »	44 »	95 »	Pleurit. purulent. Pericardit. fibrinos.
71.	P. J.	60 »	195 »	Schuss ins Stirnbein. Inter- mening. Blutung.
79.	St. Fr. 27 »	56 »	130 »	Pleuro-Pneumon.
80.	V. J. 47 »	95 »	277 »	Cor adipos. Ascites, Anasarca. Pleurit.
88.	N. Fr. 37 »	62 »	485 »	Pleuritis exsudat et adhaesiv.
100.	L. O. 27 »	38 »	200 »	Pneumon lobul. et caseos.
132.	St. A. 48 »	59 »	280 »	Peribronchit. fibros.
139.	B. Jos. 63 »	38 $\frac{1}{2}$ »	210 »	Pleurit et Pericardit. purulent.
140.	M. P. 25 »	46 »	105 »	Oedem pulm e Kyphoskolios.
144.	E. Gg. 34 »	54 »	155 »	Miliartuberkulos. d. Gehirnbas.
153.	G. M. 32 »	71 »	330 »	Pleuritis et Pericardit. fibrin.
155.	D. B. 52 »	46 »	145 »	Meningitis cerebro-spinal.
166.	A. J. 41 »	68 »	130 »	Incarceration einer Hern. in- guinal. Collaps.
169.	K. A. 41 »	67 »	315 »	Pneumon. Pleurit sero-fibrinos rechterseits.
174.	H. B. 35 »	73 »	200 »	Pleurit. purulent. fibrinos.

Gemacht im pathol. Institute zu München.

infectiöse Erkrankungen.

W e i b l i c h .

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1883.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht	Milz- volumen	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
2.	K. Joh. 31 J.	40 $\frac{1}{2}$ K.	350 gr.	Multipl. phlegmon. Abscesse.
25.	L. Cr. 52 »	43 »	120 »	Pneumon. croupos.
29.	G. Th. 59 »	61 »	110 »	Hernia incarcerat. Gangraena-
39.	A. Fl. 40 »	46 »	460 »	Pneum. croupos. Alte Leber. Syphitis.
41.	P. Alb. 13 »	21 »	130 »	Tuberkulose serofibr. Basilar- Meningitis.
63.	Sp. Fl. 35 »	39 $\frac{1}{2}$ »	305 »	Acute Miliartuberk. sämtl. Org.
64.	G. R. 40 »	53 »	285 »	Td. drch. Nachbl. n. Tracheotom.
84.	B. M. 52 »	51 »	140 »	Pleur. sero-fibr. Phleg. d. Obrarm.
87.	G. F. 57 »	27 »	50 »	Pericard. sero-purul. subacut.
133.	H. Th. 40 »	43 »	140 »	Perforat. einer Dünndarmschlg.
161.	J. Chr. 37 »	54 »	285 »	Meningit. seros.
162.	K. F. 46 »	44 »	135 »	Embolie d. l. Arter. Foss. Sylvii.
200.	N. Fr. 25 »	46 »	235 »	Pachymeningit. Fibropurulent.
215.	P. A. 77 »	52 »	210 »	Peritonit. Hydrometra. Cor- adipos.
216.	Sch. F. 13 »	21 »	70 »	Pneumon. lobul. Endocardit. subacut.
217.	S. A. 20 »	53 »	85 »	Pneumon. croupos.
263.	G. F. 71 »	36 »	75 »	Pneumon. croupos.
264.	D. Kl. 64 »	53 »	175 »	Tractur. colli fem. sin. Emphys. pulmon.
282.	B. R. 56 »	48 $\frac{1}{2}$ »	130 »	Pleurit. sero-fibrinos.
283.	H. M. 41 »	36 »	225 »	Pneumon. croup. Carcin. ven- trical.
308.	T. B.	45 $\frac{1}{2}$ »	85 »	Peritonitis purulent.
314.	G. M. 18 »	59 »	110 »	Meningit. basilar.
321.	Sch. P. 64 »	51 »	145 »	Pneumon. croupos. Fettherz.
394.	B. K. 32 »	48 $\frac{1}{2}$ »	150 »	Peritonit mit Perforation des Mastdarms.
407.	W. A. 75 »	40 $\frac{1}{2}$ »	250 »	Pleurit. exsudat.
410.	Sch. K. 53 »	70 »	225 »	Combustio grad. I u. II.
416.	D. W. 52 »	39 $\frac{1}{2}$ »	120 »	Hernia incarcerat.

Sectionen aus dem Jahre 1883.

II. Acute nicht

M ä n n l i c h .

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1883.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht	Milz- volumen.	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
175.	E. Gg. 52 J.	80 ¹ / ₂ K.	165 gr.	Phosphorvergiftung.
180.	F. A. 50 »	49 »	425 »	Pneumon. croupos.
190.	St. Jos. 53 »	48 »	120 »	Incarcerat. hern. inguinal.
199.	Fr. J. 49 »	48 »	85 »	Pneumon. croupos. fettige Herz- muskeldegenerat.
208.	Z. J. 54 »	55 »	365 »	Pericardit serofibrinos. acut.
210.	R. F. 50 »	50 ¹ / ₂ »	145 »	Myo-Peri-Endocarditis.
222.	H. J. 07 »	72 »	130 »	Peritonit. purulent.
223.	M. Fr. 18 »	44 »	140 »	Meningit. cerebro-spinal.
229.	M. J. 49 »	65 »	220 »	Pericardit haemorrhag. Hy- drothorax.
247.	K. A. 70 »	58 »	130 »	Pericardit haemorrhag. Athero- matose.
253.	E. J. 65 »	44 »	230 »	Peritonit purulent. circumscript.
262.	St. Th. 29 »	43 »	130 »	Acute Pachymeningit. intern. haemorrhag.
266.	S. Jos. 22 »	50	250 »	Miliartuberkulosis sämmtlicher Brustorgane.
267.	Ch. J. 62 »	57 ¹ / ₂ »	160 »	Perityphlit. purulent.
284.	S. J. 33 »	56 »	290 »	Acute Basilar-Meningitis.
287.	A. J. 35 »	63 »	350 »	Pleurit. Tuberkulos.
292.	E. L. 51 »	69 »	200 »	Pleurit. haemorrhag.
302.	N. A. 19 »	60 »	160 »	Perforationsperitonitis.
307.	H. M. 34 »	58 »	190 »	Apoplexia cerebri mit Zer- trümmern. d. Grosshirnschenkl.
312.	E. J. 40 »	56 »	500 »	Acute Miliartuberkulose.
341.	K. R. 15 »	46 ¹ / ₂ »	185 »	Acute gelbe Leberatrophie.
346.	M. J. 23 »	44 ¹ / ₂ »	265 »	Allg. acut. Miliartuberkulos. d. Lunge, Milz, Niere u. Leber.
351.	M. J. 53 »	61 »	150 »	Pleurit. seropurulent.
358.	W. 24 »	55 »	180 »	Fractura basis cranii.
368.	W. Frd. 25 »	68 »	135 »	Combust. grad II u. I Hyp- eraemie sämmtl. Organe.

Gemacht im pathol. Institute zu München.

infectiöse Erkrankungen.

W e i b l i c h .

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1883.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht	Milz volumen	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
433.	Z. Cl. 55 J.	49 Kilo	100 gr.	Pneumon. croupos.
461.	Sch. A. 37 »	32 »	240 »	Pachymeningit. purulent et Leptomeningit.
463.	L. Fl. 66 »	48 »	180 »	Pericardit. haemorrhag.
472.	S. A. 31 »	35 »	175 »	Pneumon. catarrh.
489.	B. Th. 39 »	30 ¹ / ₂ »	180 »	Pleurit. Beginnende Pneum. croupos.
495.	H. Th. 74 »	37 ¹ / ₂ »	80 »	Pleuritis adhaes. Pneumon. hypostat.
528.	A. M. 24 »	67 »	280 »	Nephritis subcut. Ascites. Hy- drothorax.
541.	K. F. 63 »	62 »	125 »	Thrombose d. art. foss. Sylv. dextr. Hypertroph. cordis.
545.	K. Th. 64 »	38 »	120 »	Apoplex. mening. Fettherz.
561.	M. A. 38 »	46 ¹ / ₂ »	190 »	Apoplex. cerebr.
577.	G. A. 70 »	39 »	100 »	Apoplex. cerebr. Atroph. cordis.
589.	H. J. 46 »	38 »	110 »	Meningit. Oedema cerebri.
594.	B. A. 29 »	51 »	110 »	Perimetrit et. peritonit. purul.
604.	L. O. 23 »	44 »	90 »	Meningit. cerebro-spinalis.
606.	G. K. 71 »	46 »	100 »	Emphys. pulmon. Cor adipos.
607.	B. J. 40 »	64 »	240 »	Pneum. croupos. im Stadium d. grauen Hepatisat.
613.	W. W. 63 »	37 ¹ / ₂ »	100 »	Pneumonie Kyphoskoliosis.
631.	W. Ph 37 »	44 »	110 »	Acute Peritonitis.

Sectionen aus dem Jahre 1883.

II. Acute nicht

M ä n n l i c h.

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1883.	Name und Alter des Secirten	Körperge- wicht	Milz- volumen	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
375.	Z. J. 33 J.	57 Kilo	150 gr.	Commotio cerebr. Apoplect. Herd im Scheitellappen.
379.	L. H. 20 »	60 »	200 »	Fractura vertebr. coeli.
384.	Sch. 64 »	63 »	175 »	Apoplex. cerebr. Atheromatos.
403.	S. Gg. 30 »	72 »	130 »	Commotio cerebr. Bluterguss in die Ventrikel.
408.	H. M. 51 »	51 »	200 »	Ulcus rotund. ventricul.
418.	N. J. 41 »	58 »	200 »	Pleurit. haemorrhag.
434.	W. F. 37 »	61 »	105 »	Apoplex. cerebr. Hydrocephal.
439.	H. J. 55 »	55 »	206 »	Fractur zweier Rippen, Leber- verletzung.
442.	Z. J. 38 »	51 ¹ / ₂ »	185 »	Emphysema pulmon.
444.	W. O. 38 »	48 ¹ / ₂ »	120 »	Basilar meningit. Hydroceph- al. int. et extern.
451.	K. H. 34 »	38 ¹ / ₂ »	150 »	Peribronchit. caseos Pneumon. desquamativ.
453.	N. G. 59 »	62 »	145 »	Perforativ peritonitis.
456.	A. M. 33 »	38 »	85 »	Basilar-Meningitis.
457.	J. J. 39 »	44 ¹ / ₂ »	310 »	Emphysema pulmon.
474.	E. J. 53 »	51 »	230 »	Apoplex. cerebr.
478.	K. A. 64 »	54 »	125 »	Myelitis transversa.
480.	W. G. 39 »	33 ¹ / ₂ »	180 »	Pleuritis purulent.
482.	T. J. 17 »	44 »	250 »	Pneumon. croupos.
486.	L. J. 44 »	71 »	210 »	Apoplex cerebri. Atheromatos.
500.	K. J. 24 »	44 ¹ / ₂ »	290 »	Acute Miliartuberkul. sämmtl. Organe.
509.	S. U. 31 »	44 »	120 »	Meningit basil. Hydroceph. int. et extern.
510.	S. E. 64 »	50 »	220 »	Pericardit. haemorrhg. Cor. villos.
511.	S. J. 28 »	76 »	290 »	Neph. subcut. Oedema. pulm.
521.	W. J. 32 »	55 »	135 »	Croupöse Pneumonie.
523.	H. M. 27 »	80 »	140 »	Combustio grad II.
524.	Fr. L. 60 »	55 »	160 »	Meningit. Hydroceph. intern.

Sectionen aus dem Jahre 1883.

II. Acute nicht

M ä n n l i c h .

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1883.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht	Milz- volumen	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
529.	Sch. St. 73 J.	55 Kilo	115 gr.	Pleurit. adhaesiv.
533.	K. B. 9 »	18 »	65 »	Peritonit. purulente Pyelone- phritis.
536.	K. J. 45 »	58 »	100 »	Pericardit et Pleur. sero-fibrin.
539.	T. J. 72	61 »	85 »	Apoplex. mening. nach trauma
543.	B. J. 60 »	48 »	150 »	Pneumon hypostatic. Compress. d. Trachea durch Struma.
570.	Z. S. 20 »	46 $\frac{1}{2}$ »	185 »	Peritonit. purulent.
581.	R. H. 40 »	86 »	220 »	Doppelseit. croupöse u. desqua- mativ. Pneumonie.
585.	K. J. 46 »	61 »	230	Pneumon. croupos. Pleur. sicca.
588.	M. M. 28 »	71 »	370 »	Pleur. serosa-fibrin. -haemorrh.
592.	N. N. 30 »	36 »	98 »	Pleur. sero-fibrin. haemorrhag.
597.	A. Gg. 53 »	55 »	135 »	Pleurpneumonie.
599.	W. Gg. 42 »	56 »	350 »	Gastro. Enterit haemorrhag. Intoxicatio?
603.	F. M. 42	38 »	145 »	Anaemie post amput. Neoplasm.
616.	R. J. 38 »	51 »	170 »	Cystit. purulent. Pyelonephrit.
630.	R. A. 24 »	84 »	70 »	Tod durch Verblutg. nach Am- putation d. r. Oberschenkels.

Sectionen aus dem Jahre 1884.

II. Acute nicht

M ä n n l i c h.

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1884.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht.	Milz- volumen.	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
8.	K. Fr. 29 J.	52 Kilo	200 gr.	Acute allgem. Miliartuberculos.
13.	Sch. A. 63 »	63 »	355 »	Pneumon. croupos. Empyem. Milztumor.
14.	K. J. 30 »	38 »	200 »	Pneumon. croupos. Empyem. Collaps.
36.	A. M. 85 »	59 »	165 »	Apoplexia cerebri. Pericarditis.
39.	B. Gg. 37 »	49 »	230 »	Ausgedehnte Phlegmone am Oberschenkel.
44.	W. M. 42 »	46 »	120 »	Pleurit. haemorrhag. Pachy- mening. haemorrhag.
51.	V. S. 44 »	77 »	235 »	Glottisödem. Stauung in Milz und Niere.
57.	Pf. B. 53 »	47 ¹ / ₂ »	225 »	Prolapsus ani. Embolie im rech- ten Unterlappen.
58.	G. B. 23	40	155 »	Bronchopneum. Lungenödem.
59.	K. J. 18	48 ¹ / ₂	215 »	Tuberkulöse Peritonitis.
60.	Sch. G. 58	50	500 »	Zertrümmerung des Schädels. Milztumor.
74.	L. A. 32 »	42 ¹ / ₂ »	320 »	Pleuropneumonie. Milztumor.
87.	V. Gg. 36 »	52 »	220 »	Bronchopneumon. Milztumor.
94.	Z. Fr. 48 »	51 »	290 »	Pleuropneumon. croupos. Milz- tumor.
107.	W. B. 39 »	47 »	320 »	Acute allg. Miliartuberculose.
110.	K. A. 50 »	54 »	220 »	Pneumon. croupos. Infarcte in der Milz.
115.	H. J. 48 »	56 »	260 »	Pneum. croupos. Milztumor.
119.	K. H. 29 »	43 »	175 »	Bruch der Wirbelsäule.
123.	Lz. Th. 27 »	43 »	285 »	Bronchopneumonie. Milztum.
134.	O. J. 67 »	48 »	280 »	Emphysema pulm. Pleurit. se- ros. Stauungsmilz
141.	M. J. 34 »	51 »	130 »	Pneumon. croupos.
146.	W. L. 30 »	47 »	300 »	Bronchopneumon. Hypertroph. cord Milztumor.

Gemacht im pathol. Institute zu München.

infectiöse Erkrankungen.

W e i b l i c h .

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1884.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht.	Milz- volumen.	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
21.	U. M. 54 J.	58 Kilo	180 gr.	Apoplexis cerebri. Atheromat.
26.	K. F. 43 »	40 ¹ / ₂ »	185 »	Meningit. cerebrospinal.
27.	Sp. Th. 33 »	48 »	165 »	Perforation d. S. Roman. mit Geschwüren im Darm.
28.	W. A. 72 »	52 ¹ / ₂ »	100 »	Fractura intracapsul. humeri. Thromb. in art. pulmon.
32.	Sch. L. 75 »	52 ¹ / ₂ »	225 »	Anaemie nach Darinblutung.
40.	M. A. 72 »	32 ¹ / ₂ »	115 »	Croupöse Pneumonie.
55.	B. A. 64 »	49 »	315 »	Croupös. Pneumon. 3 Bohnen grosse Nebenmilze.
65.	R. A. 36 »	38 ¹ / ₂ »	230 »	Meningit. et Pachymeningit. haemorrhag.
69.	B. A. 64 »	48 »	190 »	Croupös. Pneumon. Pleuritis.
72.	B. V. 44 »	39 ¹ / ₂ »	180 »	Basilarmeningit. Atrophie d. Herzens.
80.	P. A. 39 »	47 »	270 »	Pleuropneumonie.
83.	G. Cr. 42 »	41 ¹ / ₂ »	190 »	Apopl. cerebr. Arteriosclerosis.
84.	Th. U. 82 »	48 ¹ / ₂ »	120 »	Pleuropneumon. croupos.
88.	K. A. 74 »	40 »	70 »	Croupös. Pneumon. Graue u. rothe Hepal.
91.	B. K. 63 »	37 »	160 »	Ulcus rotund. ventriculi.
95.	R. K. 54 »	71 »	155 »	Embolie der Pulmonalis nach Mamma Extirpat.
99.	G. A. 69 »	41 »	180 »	Pleurit. serofibrin. Compres- sion der Lungen.
100.	B. Cr. 34 »	59 »	150 »	Traumatische Gangraenescenz einer Blasenstelle.
101.	St. F. 57 »	41 »	235 »	Acute allg. Miliartuberculose.
108.	St. M. 25 »	36 »	150 »	Peritonit. purulent. Thrombo- phlebitis.
129.	R. A. 24 »	36 »	125 »	Bronchopneumon. cascosa.
173.	F. M. 44 »	45 ¹ / ₂ »	110 »	Perforatio-Peritonitis Hernia in carcera.

Sectionen aus dem Jahre 1884.

II. Acute nicht

M ä n n l i c h.

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1884.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht.	Milz- volumen.	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
153.	F. Gg. 54 J.	69 Kilo	460 gr.	Pachy-Lepto-Meningit. Milz- u. Leberschwellung.
157.	B. J. 30 »	49 $\frac{1}{2}$ »	130 »	Lobulär-Pneumon. Peribron- chitis nodosa.
159.	T. J. 29 »	62 »	270 »	Bronchit. fibrinös-chylöse Pleu- rit. Stauungsmilz.
162.	Fr. L. 50 »	90 »	320 »	Apoplex. cerebr. Hypertroph. Milz, Leber, Nieren.
176.	H. F. 28 »	42 »	160 »	Pneumon. croupös. Adhaesiv- pleurit.
181.	R. J. 45 »	45 »	320 »	Pleurit et Pericardit. fibrino- purulent.
183.	G. J. 18 »	49 »	375 »	Pleurit. exsudat. Lungencom- pression.
184.	P. 49 »	55 »	280 »	Pleurit. hypostat. Pneumon.
185.	R. J. 45 »	59 »	300 »	Pleurit. fibrinopurulent. Milz- tumor.
197.	G. J. 57 »	45 $\frac{1}{2}$ »	180 »	Pneumonie im Stadium des rothen Hepatisat.
201.	E. Th. 28 »	48 »	160 »	Bronchopneumonie. Adhaesiv- pleuritis.
202.	S. Chr. 30 »	66 »	170 »	Pleurit. exsud. Compression der Lungen.
212.	Br. J. 47 »	41 »	185 »	Perforationsperitonitis.
214.	Sch. Chr. 53 »	78 »	360 »	Peribronchit. nodos. Stauung in Milz, Leber u. Niern.
232.	K. H. 50 »	50 »	115 »	Combustio.
234.	M. J. 79 »	47 »	140 »	Pleuritis serofibrinos.
235.	K. J. 27 »	62 »	215 »	Fissur der Schädelbasis.
236.	D. Gg. 27 »	52 »	170 »	Combustio.
237.	H. M. 18 »	46 »	165 »	Meningit basilar.
241.	S. Gg. 45 »	48 »	210 »	Pyopneumothorax.
242.	St. W. 51 »	58 »	270 »	Croupöse Pleuropneumonie.

Gemacht im pathol. Institute zu München.

infectiöse Erkrankungen.

W e i b l i c h .

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1884.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht.	Milz- volumen.	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
180.	M. M. 42 J.	41 Kilo	75 gr.	Hernia incarcerat inguinal.
251.	B. H.	37 »	100 »	Apoplexia cerebri.
274.	Sch. R. 24 »	30 »	155 »	Meningit. cerebro-spinal.
275.	B. M. 56 »	44 »	80 »	Pleurit. acuta. Thrombose d. Pulmonalis.
287.	K. B. 23 »	46 »	100 »	Pneumon. croupos et desqua- mativ. acut.
288.	K. O. 38 »	32 ¹ / ₂ »	100 »	Meningit. basilar.
289.	B. Fr. 38 »	56 »	120 »	Embol. d. Pulmonalarterie aus- gehend v. Thromb. i. r. Herz.
292.	Sch. B. 78 »	38 »	80 »	Apoplexia cerebr. Cor adipos.
313.	V. A. 33 »	32 »	155 »	Pneumon. lobul.
321.	W. A. 36 »	60 »	190 »	Combustio. Schwellung d. Milz, Leber, Niere.
327.	H. A. 41 »	40 »	190 »	Pneumon. croupos. Ödema pulmon.
338.	W. K. 57 »	62 »	75 »	Pericardit. haemorrhag. Gra- nularatroph. d. Milz.
349.	Sch. M. 24 »	54 »	120 »	Basilarmeningit. Gravidä VIII mens.
388.	Sch. K. 88 »	32 »	125 »	Pleurit. sero-fibrinos. Anämie.
408.	H. A. 38 »	49 »	120 »	Pelveoperitonit.
409.	B. A. 44 »	45 »	130 »	Meningit. tubercul.
414.	H. O. 76 »	28 »	85 »	Peritonitis.
429.	K. A. 72 »	33 »	230 »	Abscess in der linken Sub- maxillargegend.
434.	Sch. W. 47 »	55 »	190 »	Perforativperitonitis.
452.	K. A. 56 »	31 »	100 »	Apoplex. cerebr.
457.	E. B. 58 »	43 »	225 »	Pericardit. et Pleurit. purulent.
462.	St. Th. 37 »	45 »	150 »	Peritonit. acut.
465.	W. B. 43 »	58 »	300 »	Meningit. tuberculos.
484.	R. A. 24 »	38 »	120 »	Meningit. cerebrospinalis.
504.	B. C. 76 »	36 »	150 »	Haematom. durae matris Pachy- meningit.

Sectionen aus dem Jahre 1884.

II. Acute nicht

M ä n n l i c h.

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1884.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht.	Milz- volumen.	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
243.	G. Gg. 48 J.	50 Kilo	80 gr.	Pericarditis haemorrhagic.
250.	D. G. 62 »	48 »	150 »	Croupöse Pleuropneumonie.
259.	B. Fr. 21 »	56 $\frac{1}{2}$ »	155 »	Pneumon. croupos. Pericardit.
265.	W. H. 39 »	59 »	275 »	Croupös. Pneumon. Milztumon.
278.	K. S. 25 »	68 »	85 »	Commotio cerebris. Abnorme Kleinheit der Milz.
291.	A. J. 38 »	49 »	170 »	Acute u. subacute Miliartu- berculos. d. Lungen.
295.	B. Al. 32 »	64 »	240 »	Pleurit. et Periton. serofibrin.
310.	Sch. A. 59 »	49 »	145 »	Pleurit. et Pericard. haemorrh.
328.	G. M. 28 »	57 »	235 »	Pleurit. et Pericardit. puru- lent. Milztumor.
331.	K. A. 42 »	68 »	135 »	Bluterguss nach Rippenbruch in Thorax u. Bauchhöhle.
333.	Sch. F. 45 »	63 »	230 »	Peritonitis. Hernia incarcerat.
351.	B. A. 47 »	56 »	280 »	Acute allg. Miliartuberculose.
354.	H. J. 42 »	42 »	255 »	Pachymeningit. int. haemorr- hag. acut.
356.	L. J. 33 »	62 »	235 »	Peritonit. purulent.
370.	R. J. 26 »	46 »	130 »	Meningit. basilar.
371.	H. A. 34 »	52 »	250 »	Pleurit. exsudat. Atelectat. d. linken Lunge.
377.	K. J. 38 »	52 »	145 »	Pachymeningit. int. haemorrh.
393.	Sch. A. 68 »	37 »	160 »	Thrombos. arter. foss. Sylvii.
403.	R. H. 30 »	51 »	315 »	Haemorrhagie in beid. Lungen.
407.	Gr. J. 21 »	60 »	175 »	Pleurit. exsudat. Nephrit. pa- rench. acut.
411.	K. J. 58 »	46 »	190 »	Septomening. Hydroceph. int. et exter.
417.	W. Gg. 25 »	38 »	155 »	Pleurit. purulent. Pyopneumo- thorax.
432.	K. L. 76 »	76 »	580 »	Septomening. acut. Perisplenit.
433.	H. L. 20 »	46 »	190 »	Acute allg. Miliartuberculose.

Gemacht im pathol. Institute zu München.

infectiöse Erkrankungen.

W e i b l i c h .

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1884.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht.	Milz- volumen.	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
514.	M. Th. 36 J.	39 Kilo	150 gr.	Meningit. basil. tuberk.
515.	K. L. 43 »	70 »	215 »	Ruptur des Uterus.
519.	B. M. 50	26 »	120 »	Marasmus nach Amputation.
521.	F. M. 64 »	41 »	100 »	Apoplexia cerebr. Herzhyper- trophie.
531.	B. A. 23 »	52 »	245 »	Ulcus rotund. perforans. ven- tricul.
542.	K. A. 74 »	34 »	75 »	Apoplex. cerebr. Atheromatos.
543.	N. A. 42	61 »	221 »	Pleuropneumon. Milztumor.
544.	Sch. V. 23 »	34 »	135 »	Hüftgelenksresektion. Allgem. Anaemie.
549.	K. Th. 64 »	55 »	170 »	Pleuropneumon.

Sectionen aus dem Jahre 1884.

II. Acute nicht

M ä n n l i c h.

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1884.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht.	Milz- volumen.	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
436.	A. B. 46 J.	55 Kilo	190 gr.	Pericardit. et Pleurit sero-fibr.
439.	D. J. 47 »	61 »	380 »	Pneumonie im Stad. d. grauen Hepatisat.
444.	M. J. 28 »	60 »	200 »	Fractura cranii.
445.	F. L. 32 »	57 »	210 »	Ödema pulm. Peribronchit.
459.	K. M. 32 »	66 »	300 »	Emphysem. pulmon. Stauungs- milz.
477.	A. M. 32 »	45 »	190 »	Peritonit. tuberkul.
493.	H. V. 81 »	51 »	125 »	Pachymeningit. haemorrhag.
535.	O. J. 53 »	59 »	170 »	Pneumon. croupous. Stad. des grauen Hepatisat.
539.	M. M.	54 »	80 »	Fractura cranii.

Sectionen aus				
4.	M. Gg. 55 »	65 »	110 »	Volvulus im Colon ascendens.
9.	Gr. 64 »	78 »	305 »	Paralys. cordis. Verfettung aller Organe.
10.	M. B. 69 »	49 »	150 »	Pleurit. et Pericardit. fibrin.
12.	Sch. A. 24 »	46 »	330 »	Meningit. tuberkul.
14.	P. M. 38 »	60 ¹ / ₂ »	310 »	Pericardit. et Peritonit. fibr. Stauungsmilz.
19.	D. C. 17 »	29 »	45 »	Pneumon. croupous. Peribronch.
23.	O. B. 24 »	42 »	280 »	Acute hiliartuberkul. d. Lun- gen, Milz, Leber etc.
30.	L. M. 31 »	29 »	270 »	Meningit. basilar.
34.	A. P. 57 »	64 »	150 »	Pleuritis haemorrhagie.
35.	K. H. 78 »	43 »	100 »	Senile Bronchopneumonie.
36.	M. J. 43 »	54 »	280 »	Acute Alcoholvergiftung.
39.	A. R. 57 »	93 »	330 »	Pericard. et Peritonit. adhaes. Hydrops.
44.	B. J. 44 »	45 »	185 »	Pneumon. croupous. Emphysem.
51.	M. O. 24 »	62 »	220 »	Meningit. purulent.

Sectionen aus dem Jahre 1885.

II. Acute nicht

M ä n n l i c h.

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1885.	Name und Alter des Secirten.	Körper- gewicht	Milz- volumen	Name der Krankheit und allentfallsige Bemerkungen
57.	R. M. 48 J.	60 Kilo	190 gr.	Pleuropneumon. croupos.
62.	L. J. 66 »	51 »	110 »	Peritonitis purulent. Ileocoe- calgeschwür.
63.	J. M. 21 »	41 »	205 »	Pleuropneumon. croupos.
64.	K. A. 75 »	42 »	185 »	Pleuropneumon. croupos.
77.	G. J. 42 »	63 »	130 »	Anaemie post operation Sar- kom. Maxill.
85.	H. J. 34 »	44 »	135 »	Peribronchit. caseosa et purul.
96.	K. J. 52 »	74 »	270 »	Ödema pulmon. Emphys. pul- mon. Cor adiposum.
97.	D. J. 42 »	52 »	175 »	Pachymeningit. spinal. extern. purulent.
98.	E. 69 »	49 »	105 »	Pleuropneumon. croupos.
99.	S. M. 47 »	50 »	90 »	Apoplexie in dem rechten Strei- fen u. Sehhügel.
100.	G. M. 61 »	36 »	165 »	Acute haemorrhag. Pachyme- ningit. Haemorrh. u. chr. Nephitis.
106.	F. J. 75 »	52 »	120 »	Croupöse Pneumonie.
120.	G. J. 15 »	47 »	145 »	Perforativ-Peritonitis.

Sectionen aus dem Jahre 1883.

III. Chronische nicht M ä n n l i c h .

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1883.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht	Milz- volumen.	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
5.	R. Sch. 41 J.	48 Kilo	245 gr.	Peribronch. multipl. Hepati- sation.
6.	H. Fr. 30 »	33 $\frac{1}{2}$ »	200 »	Phthisis pulmon.
9.	C. Sch. 32 »	43 »	225 »	Peribronch. caseos. et purul. Cirrhose Ab.
10.	J. Gg. 34 »	44 $\frac{1}{2}$ »	220 »	Phthisis. Pleurit. adhaesiv.
11.	Sp. Ag. 26 »	34 $\frac{1}{2}$ »	215 »	Phthisis combinata.
13.	B. Jos. 33 »	49 $\frac{1}{2}$ »	165 »	Phthisis combinata.
17.	Sch. F. 30 »	63 $\frac{1}{2}$ »	160	Phthisis pulmon. Muscatnuss- leber.
22.	R. Jos. 49 »	59 $\frac{1}{2}$ »	250 »	Rückenmarksdegenerat. Tu- berkulosi.
24.	St. J. 56 »	42 »	255 »	Phthisis pulmon. Pericardit. sero-fibrin.
28.	Sch. H. 32 »	48 $\frac{1}{2}$ »	345 »	Nephritis chronica. Dilatat. ven- tric. cord. sinist.
30.	D. A. 50 »	42 »	150 »	Phthisis combinat.
33.	D. Gg. 37 »	48 »	250 »	Phthisis combinat.
35.	M. J. 56 »	35 »	105 »	Caries der Lendenwirbel.
40.	W. Gg. 59 »	64 »	100 »	Granularatrophie der Niere.
49.	H. J. 41 »	57 »	150 »	Myodegenerat. cordis.
50.	H. Fr. 29 »	52 $\frac{1}{2}$ »	265 »	Phthisis pulmon. Pleurit. ad- haesiv.
56.	Z. Fr. 27 »	50 $\frac{1}{2}$ »	185	Phthisis pulm. Miliartuberk.
68.	Sch. T. 58 »	36 $\frac{1}{2}$ »	200 »	Myodegenerat. cord. Atherom.
78.	M. R. 39 »	56 »	180 »	Path'sis combin.
82.	K. A. 44 »	40 »	180 »	Stenose d. Gallengänge. Icterus
83.	K. J. 69 »	35 »	135 »	Icterus. Atroph. cordis.
89.	Bl. J. 22 »	43 $\frac{1}{2}$ »	220 »	Graue Degenerat. im Dorsal u. Lendenmark.
94.	K. J. 65 »	32 $\frac{1}{2}$ »	65 »	Phthisis pulmon.
96.	J. P. 33 »	64 »	295 »	Phthisis pulmon. Pleurit. ad- haesiv.

Gemacht im pathol. Institute zu München.

infectiöse Erkrankungen.

W e i b l i c h .

Fortlauf. Nr. des Sections- berichtes 1884.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht	Milz- volumen	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
3.	S. Fr. 32 J.	40 1/2 K.	220 gr.	Alte Phthisis, Pleurit. fibrin.
7.	E. Fl. 61 „	46 „	135 „	Ulcus ventricul. perfor.
15.	D. C. 79 „	34 „	100 „	Myocarditis chronic.
16.	M. M. 28 „	39 „	190 „	Phthisis comb. Pleur. adhaes.
18.	H. M. 40 „	52 1/2 „	230 „	Endocardit. Stenosei. Insuffic. d. Aorta.
20.	M. A. 51 „	52 „	90 „	Abdominal Schwangerschaft Perforation ins Periton.
21.	K. R. 34 „	53 „	165 „	Phthisis combinat.
23.	Sch. A. 54 „	41 1/2 „	230 „	Carcinoma vagin. et uteri.
26.	Sp. Cr. 57 „	35 „	140 „	Carcin. vag. et uteri. (Mark- schwamm).
31.	W. M. 66 „	59 „	145 „	Myodegenerat. cordis. Emphys. pulmon.
36.	O. K. 48 „	31 „	165 „	Caries der Lendenwirbelsäule.
43.	W. Joh. „	56 „	50 „	Endocard. chron. Pachy-Me- ning. intern.
46.	F. M. 65 „	58 „	200 „	Pigment.-Degener. cord. Athe- romatos.
48.	N. Kl. 38 „	41 1/2 „	290 „	Pleur. tuberk. adhaes. Tuberk.
58.	K. A. 48 „	51 „	140 „	Kystoma ovar.
60.	R. A. 55 „	53 „	90 „	Endocardit. fibros. chronic.
67.	K. B. 23 „	32 „	325 „	Phthisis pulmon.
69.	H. Cr. 38 „	29 „	180 „	Phthis. pulm. Multipl. Sclerose d. Gehirns.
72.	Z. Chr. 53 „	53 „	225 „	Myodegenerat. cord. Emphys. pulmon.
74.	O. M. 65 „	37 „	110 „	Phthisis pulmon. combinat.
75.	H. L. 67 „	42 1/2 „	150 „	Myodegener. cord. Hydrothor.
77.	R. Cr. 57 „	26 „	100 „	Glio-Sarkom. d. Rückenmarks.
86.	K. R. 37 „	42 „	100 „	Neoplasm. in rect. et vag. (Operirt.)
95.	K. M. 59 „	50 „	130 „	Carcinoma pylori et duoden.

Sectionen aus dem Jahre 1883.

III. Chronische nicht M ä n n l i c h .

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1883.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht	Milz- volumen	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
98.	K. J. 22 J.	47 Kilo	1105gr.	Lienale, lymphat. myelogene Leukaemie. Milzgrösse $23 \times 14,5 \times 8,0$. Kapsel sehr ge- spannt, sammtartige Trübung, Consistenz denb. Blutreich.
104.	W. J. 32 »	58 »	255 »	Phthisis combinat.
107.	W. A. 30 »	90 »	166 »	Phthisis pulmon.
110.	Z. Gg. 41 »	57 »	145 »	Myodegenerat. cordis.
115.	B. L. 65 »	51 »	185 »	Phthisis comb.
116.	M. Gg. 70 »	39 »	90 »	Atheromatos. Lungencirrhose.
117.	M. Gg. 55 »	60 $\frac{1}{2}$ »	225 »	Atheromatos. Insufficienz der Aorta.
122.	F. M. 47 »	81 »	145 »	Endocardit. Atheromatos.
123.	Th. G. 41 »	55 »	90 »	Phthisis combinat.
130.	K. Gg. 34 »	53 »	300 »	Phthisis combinat.
131.	L. F. 14 $\frac{1}{2}$ »	33 »	100 »	Caries d. l. Beckens u. Fem.
134.	G. J. 58 »	57 »	100 »	Myodegenerat. cord. Atherom.
135.	St. J. 71 »	58 »	270 »	Myodegenerat. cordis. Lipoma- tosis.
136.	H. O. 34 »	45 »	355 »	Phthis. pulmon.
141.	K. V. 48 »	40 $\frac{1}{2}$ »	335 »	Phthis. combin.
143.	R. G. 17 »	35 $\frac{1}{2}$ »	110 »	Schrumpf-Niere.
145.	St. Jos. 37 »	53 »	315 »	Phthis. combin.
146.	S. A. 60 »	41 »	100 »	Phthis. pulmon.
149.	M. Fr. 22 »	36 »	285 »	Phthis. combin.
150.	Pf. L. 49 »	73 »	145 »	Myocarditis. Schrumpfniere.
151.	F. J. 49 »	37 $\frac{1}{2}$ »	100 »	Phthisis pulmon.
154.	H. B. 62 »	45 »	230 »	Phthisis pulmon.
158.	B. J. 26 »	41 »	350 »	Caries des Kniegelenkes.
163.	E. J. 36 »	53 »	260 »	Phthisis combinat.
164.	F. J. 48 »	53 »	570 »	Miliartuberkul. der Lungen, Leber, Milz u. Nieren.
165.	Z. M. 84 »	45 »	210 »	Phthisis pulmon.

Gemacht im pathol. Institute zu München.

infectiöse Erkrankungen.

W e i b l i c h .

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1883.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht.	Milz- volumen.	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
97.	Sch. A. 57 J.	36 Kilo	70 gr.	Carcinoma ventriculi.
99.	H. B. 64 »	50 »	130 »	Carcinoma mammae.
101.	B. B. 49 »	50 ¹ / ₂ »	100 »	Myxomatös. Lympho-Sarkom.
102.	W. J. 26 »	48 »	160 »	Phthisis pulmon.
103.	L. Cr. 27 »	23 »	175 »	Phthisis pulm. Atroph. cord. Thromb.
105.	R. W. 67 »	43 ¹ / ₂ »	90 »	Carcinoma ventricula.
108.	N. W. 38 »	45 »	210 »	Phthisis pulmon.
111.	Sch. J. 86 »	23 »	60 »	Atheromatose. Pulmonal.- Thrombose.
114.	Rh. M. 57 »	56 ¹ / ₂ »	150 »	Fettig degener. Pflasterepi- thelkrebs uteri.
120.	Sch. M. 27 »	68 ¹ / ₂ »	165 »	Perniciöse Anaemie.
125.	H. A. 54 »	34 »	50 »	Carcinom. pylor.
128.	F. R. 20 »	26 »	265 »	Caries femor.
138.	M. E. 70 »	26 »	75 »	Carcinoma myxomatodes.
142.	G. Cr. 83 »	35 »	140 »	Lungenkrebs, Allg. Marasmus.
147.	Sch. M. 74 »	41 »	120 »	Atheromat. d. Gehirn- u. Co- ronar-Gefäße.
157.	Sch. M. 69 »	42 »	135 »	Carcinom der Gallenblase u. der Leber.
176.	M. M. 62 »	33 »	145 »	Sarkom d. r. Stirnlappen.
179.	Sch. S. 44 »	37 »	180 »	Carcinom. port. vaginal. uter.
183.	O. Th. 42 »	77 »	235 »	Morphinismus. Myodegenerat. cordis.
184.	M. J. 20 »	38 »	135 »	Schrumpfnieren. Hypertr. et Dilat. cordis.
186.	H. V. 52 »	33 »	135 »	Carcinom d. Haut (operirt).
191.	P. Fr. 20 »	39 »	130 »	Phthisis pulmon.
192.	Fl. B. 23 »	43 »	130 »	Phthisis pulmon.
196.	A. M. 26 »	43 ¹ / ₂ »	265 »	Phthisis pulmon.
213.	V. V. 42 »	33 »	185 »	Phthisis pulmon. combin.
220.	St. M. 24 »	29 ¹ / ₂ »	120 »	Phthis. pulm. Pleurit. adhaes.

Sectionen aus dem Jahre 1883.

III. Chronische nicht M ä n n l i c h.

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1883.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht.	Milz- volumen.	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
170.	M. J. 48 J.	46 Kilo	170 gr.	Phthisis pulmon.
172.	K. O. 42 »	79 »	135 »	Insufficienz d. Aorta. Ascites.
177.	B. J. 58 »	46 »	140 »	Phthisis pulmon.
187.	D. M. 52 »	61 »	140 »	Phthisis pulm. Verkäsg. d. l. Nebenhodens.
188.	F. S. 30 »	50 »	280 »	Chron. u. subacute Pthis. pulm.
189.	K. B. 29 »	46 »	250 »	Phthis. pulm. comb. Cavernen.
193.	W. B. 40 »	39 »	110 »	Phthis. pulm. chron. Cavernen.
194.	S. St. 21 »	41 »	230 »	Pthisis pulmon.
197.	G. J. 18 »	38 ¹ / ₂ »	190 »	Phthisis pulmon.
198.	P. Gg. 22 »	42,5 »	190 »	Phthisis pulm. mit Cavernen.
201.	W. N. 46 »	57 »	175 »	Phthisis pulmon. combinat.
201.	R. A. 28 »	40 »	200 »	Phthis. pulm. Pyopneumotho- rax rechts.
205.	W. S. 43 »	45 »	150 »	Phthisis pulm. mit Cavernen. Splenit.
207.	H. A. 48 »	38 ¹ / ₂ »	130 »	Phthisis pulmon.
211.	St. J. 42 »	45 »	130 »	Phthisis pulmon. Fettige De- generat. d. Herzmuskels.
212.	W. J. 26 »	52 »	200 »	Phthisis pulmon.
221.	St. M. 40 »	80 »	280 »	Fett. Degenerat. d. Herzmusk. Beiderseit. Hydrothorax.
225.	Sch. H. 25 »	50 »	230 »	Phthisis pulmon.
226.	L. L. 42 »	68 »	370 »	Endocard. chron. Insuffic. u. Stenos. d. ost. aortic.
230.	B. Fr. 65 »	33 ¹ / ₂ »	100 »	Leberabscess m. Perforat. durch die Bauchdecken.
231.	W. J. 22 »	32 ¹ / ₂ »	225 »	Phthisis pulmon. Desquama- tivpneumon.
232.	W. M. 29 »	40 »	295 »	Phthisis pulmon. combinat.
234.	M. M. 24 »	36 ¹ / ₂ »	200 »	Phthisis pulm. chronic. mit Cavernenbildung.
235.	S. Gg. 54 »	36 ¹ / ₂ »	105 »	Phthis. pulm. mit Cirrhose u. Cavernenbildung.

Gemacht im pathol. Institute zu München.

infectiöse Erkrankungen.

W e i b l i c h .

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1883.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht	Milz- volumen	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
228.	H. F. 75 J.	46 Kilo	75 gr.	Marasmus senil. Endocard. chron. fibros.
246.	Sch. D. 21 »	38 »	185 »	Phthisis pulm. comb.
250.	H. K. 16 »	29 »	85 »	Phthis. pulm. chron. Peri- bronch. purul.
254.	G. A. 21 »	38 ¹ / ₂ »	140 »	Caries. gonitis purulent.
276.	F. C. 73 »	29 ¹ / ₂ »	40 »	Carcinom. ventricul. (pylor).
285.	B. M. 75 »	34 »	170 »	Phthisis pulmon.
289.	St. C. 35 »	35 »	130 »	Phthisis pulmon.
296.	Sch. F. 35 »	68 ¹ / ₂ »	119 »	Insufficiencia velvul. mitral.
301.	St. M. 40 »	32 ¹ / ₂ »	100 »	Phthis. pulm. chronii.
303.	Sp. A. 34 »	42 »	190 »	Lungensyphilis.
315.	M. F. 45 »	49 ¹ / ₂ »	130 »	Carcinoma port. vaginal et cervicis.
317.	D. K. 65 »	36 »	120 »	Carcinom. mammae. Caries costae III.
318.	K. K. 51 »	39 »	250 »	Progressiv. perniciöse Anaem.
320.	M. A. 83 »	41 »	85 »	Gangraen. digit. I. Marasmus.
323.	D. Fr. 33 »	45 »	165 »	Phthis. comb. m. Cavernenbild.
330.	H. B. 50 »	47 »	100 »	Carcinoma uteri.
331.	Sch. M. 73 »	40 »	135 »	Carcinom. faciei et capitis.
336.	B. J. 62 »	51 »	620 »	Lympho-Sarkomatose d. Me- senterial-Drüsen.
337.	M. J. 57 »	83 ¹ / ₂ »	175 »	Endocardit. chron. fibros.
338.	F. Cr. 64 »	46 »	110 »	Myodegeneratio cordis.
349.	Sch. W. 52 »	40 ¹ / ₂ »	130 »	Carcinom. recti. (Operirt).
350.	J. Fr. 72 »	36 ¹ / ₂ »	300 »	Phthis. pulm. Pachymening. chronic. fibros.
355.	M. M. 53 »	50 »	280 »	Phthis. pulm. Peribronchit no- dosa et caseosa.
359.	B. A. 72 »	62 »	97 »	Weisse u. rothe Erweichung des Gehirns.
361.	F. Th. 26 »	26 ¹ / ₂ »	295 »	Phthis. combin. mit Cavernen.

Sectionen aus dem Jahre 1883.

III. Chronische nicht

M ä n n l i c h.

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1883.	Name und Alter des Secirten	Körperge- wicht	Milz- volumen	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
237.	A. H. 47 J.	75 K.	185 gr.	Gangraena crur. sinist. Thromb.
240.	E. P. 57 »	64 $\frac{1}{2}$ »	52 »	Carcinoma hepatis. (Milz S 20,5 $\times$ B 10,5 $\times$ D 5,2.)
242.	A. B. 34 »	65,5 »	120 »	Phthisis pulmon. comb.
243.	B. J. 57 »	43 »	115 »	Phthis. pulmon. chron. Peri- bronch. fibros.
244.	R. J. 48 »	64 »	195 »	Endocard. fibr. chron. Insuff. d. ost. aortic.
245.	Sch. M. 51 »	66 »	110 »	Carcinom. ventricul.
248.	F. Fr. 68 »	72 »	85 »	Endocard. fibros. chron. Ödem der Lungen.
251.	Sch. G. 48 »	40 $\frac{1}{2}$ »	150 »	Parotitis purul. Schrumpfniere.
255.	Sch. G. 31 »	46 »	65 »	Carcinoma ventriculi in part. pylor.
261.	H. Gg. 70 »	49 $\frac{1}{2}$ »	130 »	Myodegenerat. cordis.
268.	W. J. 24 »	46 »	200 »	Caries u. Nekrose des rechten Oberschenkels.
271.	K. H. 30 »	57 $\frac{1}{2}$ »	175 »	Phthisis pulmon. chronic.
272.	L. J. 18 »	48 $\frac{1}{2}$ »	160 »	Caries der Brustwirbel. Rothe Erweichung.
274.	M. V. 16 »	36 »	195 »	Phthis. pulmon.
275.	J. Gg. 24 »	58 $\frac{1}{2}$ »	385 »	Endocard. chronic. fibr. Ste- nose d. Aorta.
278.	L. J. 56 »	66 »	295 »	Hypertroph. cordis.
279.	K. O. 46 »	39 »	170 »	Phthis. pulmon. Cavernen.
280.	Sch. 48 »	60 »	230 »	Morb. Brighti. (III. Stad.)
281.	D. Fr. 40 »	58 »	170 »	Hypertroph. et Dilatat. cord.
288.	P. B. 34 »	42 »	162 »	Diabetes.
290.	K. J. 32 »	43 »	110 »	Phthis. pulmon.
294.	R. E. 28 »	41 »	115 »	Phthis. pulm. Ödema cerebr.
297.	P. H. 39 »	46 $\frac{1}{2}$ »	170 »	Phthis. pulm. Caries d. Fuss- wurzelknochen.
298.	v. R. O. 26 »	77 »	355 »	Phthis. pulmon mit Cavernen und Cirrhose.

Gemacht im pathol. Institute zu München.

infectiöse Erkrankungen.

W e i b l i c h .

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1883.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht	Milz- volumen	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
365.	G. Th. 25 J.	46 Kilo	300 gr.	Caries d. letzten Lendenwirbel u. d. Basis d. Kreuzbeins.
381.	W. B. 73 »	26 »	85 »	Cirrhose beider Oberlappen. Atrophie d. Leber u. Milz.
392.	P. M. 56 »	44 »	65 »	Carcinom. mammae. Fettherz.
401.	D. M. 44 »	29 ¹ / ₂ »	125 »	Phthis. pulmon.
405.	D. A. 55 »	32 »	165 »	Carcinom pylor.
414.	D. K. 45 »	68 »	120 »	Hypertroph. et dilat. cord. Ödema pulmon.
425.	Fr. M. 44 »	33 ¹ / ₂ »	180 »	Myodegenerat. cordis. Ödema pulmon.
430.	S. Fl. 58 »	51 »	200 »	Morb. Brightii. Hydronephrose.
436.	W. S. 53 »	37 »	90 »	Carcinom. recti.
437.	W. A. 62 »	50 »	205 »	Endocardit. calculos. Stenose d. Aorta ostiums.
441.	E. M. 38 »	25 »	115 »	Phthisis pulmon. Fettleber.
445.	M. A. 33 »	30 »	150 »	Carcinom. uteri.
458.	H. F. 28 »	53 »	265 »	Endocardit. chron. Stenose d. Mitralis.
459.	H. R. 29 »	45 »	285 »	Myodegenerat. cordis.
469.	G. G. 70 »	36 »	140 »	Carcinom. hepat.
471.	M. A. 36 »	28 »	185 »	Carcinom. uteri.
477.	H. A. 31 »	30 »	155 »	Carcinom. uteri.
479.	Sch. A. 20 »	34 »	110 »	Caries pelvis. Peritonit purul.
483.	H. A. 38 »	49 »	85 »	Carcinoma ventriculi.
485.	M. M. 76 »	30 »	80 »	Atheromatos. Marasmus genil.
504.	R. A. 59 »	41 »	200 »	Pyelonephrit. Cystit. purulent.
505.	Ch. A. 77 »	34 »	70 »	Papillar. Carcinom. d. Magens.
525.	A. F. 48 »	45 »	150 »	Carcinoma uteri.
526.	W. J. 57 »	60 »	145 »	Hypathroph. et dilat. cord. Ent- artung d. Semilunarklappen.
532.	F. C. 15 »	23 »	115 »	Phthis. pulmon. Ileocalgeschw.
537.	K. R. 61 »	38 »	150 »	Carcinom. vagin. et port. vagin.

Sectionen aus dem Jahre 1883.

III. Chronische nicht

M ä n n l i c h .

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1883.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht.	Milz- volumen.	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
299.	B. J. 24 J.	46 Kilo	370 gr.	Endocardit. aort.
300.	W. E. 28 »	49 »	100 »	Nephritis; Myelitis.
305.	S. J. 46 »	49 »	260 »	Caries d. I. u. II. Lendenwir- bel. (Senkungsabscess.)
306.	B. J. 50 »	47 »	140 »	Phthisis pulmon.
310.	H. R. 51 »	30 ¹ / ₂ »	70 »	Endocardit. aortic. verr.
311.	N. M. 71 »	35 »	90 »	Endocard. chronic. Stenose d. Aortenostiums.
327.	Sch. B. 40 »	56 »	260 »	Phthis. pulm. Anaemia cerebr.
342.	H. R. 45 »	35 ¹ / ₂ »	90 »	Phthisis pulmon.
344.	St. L. 26 »	35 »	140 »	Phthis. pulmon. mit Cirrhose und Cavernen.
348.	B. Fr. 32 »	32 »	255 »	Phthisis pulmon. chron.
353.	L. J. 28 »	49 »	270 »	Phthisis. pulm. Thrombos d. ven. crural. sin.
357.	H. H. 23 »	41 »	260 »	Phthis. pulm. mit ausgedehn- ten Cavernen.
360.	B. A. 21 »	41 »	130 »	Phthisis pulm. Fettherz.
378.	St. G. 62 »	47 »	190 »	Septomening. chron. fibr. Hy- droceph. int. et extern.
382.	St. G. 59 »	75 ¹ / ₂ »	230 »	Hypertroph. et dilat. cord.
388.	G. J. 32 »	42 »	250 »	Phthis. pulmon.
391.	S. A. 17 »	30 »	175 »	Phthis. pulm. Hydroceph. int. et extern.
395.	St. J. 42 »	55 »	175 »	Phthisis pulm. Morbus Brig- thii III. Stad.
404.	Sch. R. 66 »	69 »	175 »	Hypertroph. cord. Lebercirrh.
411.	Sch. O. 26 »	47 »	215 »	Phthis. comb. mit Cirrhose, Cavernenbildung.
412.	P. N. 56 »	55 »	190 »	Hypertroph. cordis. Granular- atroph. d. Nieren.
413.	J. L. 22 »	36 ¹ / ₂ »	200 »	Phthis. pulmon.
419.	M. L. 45 »	42 »	780 »	Amyloiddegenerat. d. Leber.

Gemacht im pathol. Institute zu München.

infectiöse Erkrankungen.

W e i b l i c h .

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1883.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht	Milz- volumen	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
542.	M. Th. 50 J.	43 Kilo	250 gr.	Carcinoma uteri. Tumor ovar.
549.	S. Th. 27 »	44 »	190 »	Rundzellen-Sarkom d. Ovarien u. d. Rectum.
556.	B. B. 66 »	44 »	160 »	Myodegeneratio cordis.
562.	B. Fr. 72 »	36 $\frac{1}{2}$ »	225	Endocardit. mitral. chron. fibr.
565.	M. Th. 49 »	64	190 »	Hydropericardium. Offenblei- ben d. foram. ovale.
567.	F. F. 63 »	41 »	50 »	Carcinoma recti.
572.	E. A. 27 »	36 $\frac{1}{2}$ »	95 »	Caries d. Felsenbeins. Mening.
582.	W. M. 41 »	29 »	70 »	Carcinoma uteri.
583.	B. M. 60 »	31 $\frac{1}{2}$ »	150 »	Carcinoma hepat. Ascites hae- morrhag.
593.	B. Th. 28 »	51 »	185 »	Phthis. pulm. m. Cavernenbild.
598.	M. Fr. 65 »	63 $\frac{1}{2}$	135 »	Endocardit. chron. fibros. Hy- drops universal.
601.	Pf. S. 52 »	75 »	140 »	Fibro-Sarkom d. rechten Ova- riums. Allg. Hydrops.
611.	Sch. M. 63 »	94 »	90 »	Endocard. valvularis fibros. et calculos. chronic.
620.	D. M. 21 »	40 $\frac{1}{2}$ »	125	Phthisis pulmon. Tuberkulöse Darmgeschwüre.
629.	F. R. 36 »	36 »	150 »	Phthis. pulm. m. Cavernenbild.
633.	W. W. 26 »	41 »	230	Phthisis pulmon. Parenchymat. Nephritis.
636.	H. R. 18 »	41 $\frac{1}{2}$	130 »	Phthisis pulm. Pleurit. chron. adhaes.
639.	O. W. 19	33 $\frac{1}{2}$	250	Phthisis pulmon. Desquamät. Pneumon.
641.	Sp. M. 18	40 $\frac{1}{2}$	225 »	Phthisis combinat. Cavernen.

Sectionen aus dem Jahre 1883.

III. Chronische nicht

M ä n n l i c h .

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1883.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht	Milz- volumen	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
420.	B. A. 61 J.	45 Kilo	550 gr.	Primärer Krebs d. Leber.
427.	W. J. 30 »	45 »	295 »	Phthis. pulmon. Tuberkulöse Darmgeschwüre.
428.	B. Fr. 30 »	51 »	515 »	Phthisis combinat.
429.	V. H. 57 »	43 ¹ / ₂ »	100 »	Phthis. pulm. Apoplex cerebr.
431.	N. M. 44 »	40 »	115 »	Phthisis pulmon.
432.	M. J. 57 »	43	100 »	Carcin. d. Unterlippe (operirt).
435.	Fr. L. 36 »	37 ¹ / ₂ »	295 »	Phthis. pulm. mit Cavernen.
446.	S. P. 69 »	51 »	285 »	Phthis. pulm. Stauungsleber.
447.	L. J. 28 »	71 »	220 »	Phthis. pulmon. Ascites, Hy- drothorax.
448.	K.	45 »	235 »	Atroph. cord. Lebercirrhose.
449.	K. J. 74 »	69 »	120 »	Myodegeneratio cord.
454.	Sch. J. 12 »	28 ¹ / ₂ »	65 »	Paralys. infant. spinal.
465.	H. J. 59 »	78 »	200 »	Hypertroph. et dilatat. cord. Ascites.
467.	H. J. 55 »	38 ¹ / ₂ »	160 »	Phthis. pulmon.
473.	D. R. 27 »	44 »	190 »	Gonitis fungos. Ödema pulm.
476.	K. Fr. 38 »	42 ¹ / ₂ »	240 »	Chron. interstitielle Pneumon.
484.	H. A. 30 »	68 ¹ / ₂ »	280 »	Hypertr. et Dilatat. cord. Le- bercirrhose.
487.	R. L. 45 »	79	235 »	Phthis. pulm. Adhaesivpleurit.
488.	B. J. 39 »	51 »	560 »	Phthisis pulmon. Milztumor.
490.	H. C. 41 »	51 ¹ / ₂ »	405 »	Phthisis pulmon.
494.	N. H. 32 »	43 ¹ / ₂ »	230 »	Phthisis pulm. mit Cavernen.
496.	W. M. 38 »	46 ¹ / ₂ »	190 »	Phthis. pulmon. mit Cirrhose und Cavernen.
497.	K. Fr. 24	57	230 »	Phthisis pulmon. mit hochgra- diger Cirrhose.
499.	U. B. 55	37 »	120 »	Phthisis pulmon. Dilatation beider Ventrikel.
501.	Sch. C. 29	38 »	175 »	Phthisis. pulmon. Stauung in Leber und Milz.

Sectionen aus dem Jahre 1883.

III. Chronische nicht

Männlich.

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1883.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht.	Milz- volumen.	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
502.	Sch. J. 21 J.	38 Kilo	140 gr.	Phthis. pulm. Pleur. adhaesiv.
506.	M. O. 42 »	40 »	135 »	Carcinoma ventric. (Cirrhos.).
507.	H. G. 35 »	43 »	165 »	Phthis. pulm. Pneum. desquam.
515.	L. J. 37 »	48 »	140 »	Phthisis pulmon. mit Caver- nen u. Cirrhose.
516.	Fr. G. 48 »	56 »	220 »	Carcinoma angular. maxill. infer. dextr.
522.	Fr. P. 55 »	60 $\frac{1}{2}$ »	250 »	Carcinoma recti mit Metasta- sen in der Leber.
544.	A. Th. 52 »	49 »	120 »	Phthis. pulm. Pleur. adhaesiv.
550.	B. M. 30 »	30 »	250 »	Phthisis pulm. Dilatat. cordis.
571.	E. J. 31 »	48 $\frac{1}{2}$ »	280 »	Phthisis pulm. mit Cavernen u. Cirrhose.
573.	M. Ch. 38 »	54 $\frac{1}{2}$ »	210 »	Hypertroph. cordis. Lungenin- farkte.
576.	B. J. 54 »	69 $\frac{1}{2}$ »	740 »	Leberabscess. Verschluss des duct. choledochus.
591.	V. Gg. 43 »	64 »	700 »	Phthis. pulm. Cirrhose, schief- rige Induration.
602.	Sch. B. 37 »	65 »	270 »	Phthis. pulm. Desquamativ- Pneumon.
614.	M. S. 73 »	56 »	200 »	Myodegenerat. cord. Athero- matos. d. Coronararter.
618.	M. B. 37 »	48 $\frac{1}{2}$ »	230 »	Sarkoma carcinomatodes des Mediast. u. d. Pleura.
621.	Bl. V. 31 »	48 »	160 »	Phthis. pulm. Schiefrig. Indur.
626.	St. R. 16 »	38 »	80 »	Lithiasis. Perforation im kl. Becken.
627.	B. B. 17 »	33 $\frac{1}{2}$ »	130 »	Caries d. Brustwirbelsäule
634.	S. W. 29 »	48 »	230 »	Phthis. pulm. Atroph. hepat.
635.	W. C. 50 »	43 »	230 »	Carcinom. ventriculi. Allgem. Icterus.
640.	Sch. V. 62 »	33 $\frac{1}{2}$ »	250 »	Gangraen. Alte Phthisis.

Gemacht im pathol. Institute zu München.

infectiöse Erkrankungen.

W e i b l i c h .

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1883.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht	Milz- volumen	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
---	------------------------------------	--------------------	------------------	---

Sectionen aus dem Jahre 1884.

III. Chronische nicht M ä n n l i c h.

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1884.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht.	Milz- volumen.	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
2.	D. J. 36 J.	58 $\frac{1}{2}$ K.	315 gr.	Myodegenerat. cordis. Lungen- Ödem. Milztumor.
3.	K. M.	46 »	240 »	Phthis. pulm. Peribronch. nod.
4.	B. J. 45 »	30 »	160 »	Phthis. pulm. Enterit. tuberkul.
7.	W. B. 49 »	63 »	140 »	Phthisis pulmon. Pleurit. ad- haes. chronic.
10.	F. M. 34 »	50 »	135 »	Phthisis combinat. Dilatat. sämmtl. Herzabtheilg.
11.	K. J. 16 »	41	195 »	Phthis. pul. Pneumopyothorax.
12.	B. L. 26 »	40 »	130 »	Phthisis pulm. mit Cavernen u. Cirrhosenbildungen.
15.	R. M. 58 »	40 »	210 »	Carcinoma ventriculi.
19.	St. J. 29 »	32 $\frac{1}{2}$ »	275 »	Phthis. comb. lobulös. Hepatis.
22.	G. S. 56 »	60 $\frac{1}{2}$ »	350 »	Lebercirrhose. Hydropsascites. Fettherz.
25.	H. X. 56 »	49 »	300 »	Endocardit. calculos. Myode- generat. cordis.
29.	Th. B. 30 »	75 »	150 »	Myodegenerat. cordis. Stauung in Milz, Leber, Niere,
38.	E. G. 38 »	44 »	370 »	Phthis. pulm. Milz enthält hämorrhag. Neubildung.
48.	B. 19 »	35 »	150 »	Phthis. combin. Cavern. Cirrh.
56.	M. J. 40 »	35 $\frac{1}{2}$ »	150 »	Phthis. combin. Cavernen.
61.	H. R. 29 »	44 »	150 »	Phthis. pulmon. Pleurit. exsud.
63.	M. M. 44 »	61 »	350 »	Dementia paralytic.
66.	W. H. 62 »	41 »	180 »	Phthis. pulmon. Septomening. chronic.
71.	B. Gg. 32 »	39 $\frac{1}{2}$	170 »	Phthis. pulmon. Embolie der Lungenarterie.
86.	E. J. 40 »	47 »	105 »	Endocardit. fibr. chronic.
90.	E. L. 25 »	39 »	210 »	Nekrosis femor. Starke Anaem.
96.	B. Fr. 37 »	67 »	180 »	Hypertroph. et dilat. cordis. Pericardit. adhaesiv.

Gemacht im pathol. Institute zu München.

infectiöse Erkrankungen.

W e i b l i c h .

Fortlauf. Nr. des Sections- berichtes 1884	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht	Milz- volumen	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
6.	L. H. 67 J.	42 Kilo	90 gr.	Carcinoma ventriculi am Py- lorustheil.
9.	Z. Kl. 36 »	36 »	174 »	Carcin. ventric. a. Pylorustheil.
16.	G. A. 24 »	38 ¹ / ₂ »	155 »	Phthis. pulmon. mit Cavernen u. Cirrhose.
33.	B. M. 36 »	46 ¹ / ₂ »	28 »	Chron. Nephrit. Milztumor.
34.	E. A. 30 »	41 »	135 »	Phthis. pulmon. Fettleber.
42.	H. Fr. 33 »	65 »	570 »	Carcinom. ventric. pylor.
46.	Z. A. 52 »	50 ¹ / ₂ »	196 »	Carcin. pylor. Myofibroma uter.
52.	A. M. 61 »	62 »	100 »	Endocardit. chron. fibros. Mehr- fache Thromben.
77.	R. F. 44 »	58 »	260 »	Progress. pernicios. Anaemie. Hydrops. univers.
79.	K. Th. 54 »	41 »	125 »	Phthis. pulmon. mit Cavernen.
85.	M. B. 49 »	45 »	200 »	Carcinoma uteri.
92.	J. M. 54 »	64 »	245 »	Chron. Endocardit. fibr. calcul. valvul. Mitral.
93.	F. B. 20 »	40 »	275 »	Phthis. pulm. Pleurit. serofibr.
97.	M. Fr. 30 »	43 »	120 »	Phthis. pulmon. Anaemie.
118.	P. B. 32 »	52 »	235 »	Carcinoma port. vaginal.
120.	F. Fr. 74 »	58 »	75 »	Carcinoma corpor. uteri.
139.	Sch. T. 29 »	57 »	140 »	Myodegener. cordis. Myocardit.
142.	L. M. 64 »	64 »	140 »	Myodegenerat. cord. Lungen- infarcte.
143.	R. R. 38 »	38 »	145 »	Phthis. combin. Stauungsmilz.
156.	N. M. 66 »	45 »	115 »	Carcin. beid. Ovarien u. d. Leb.
160.	R. M. 21 »	41 »	220 »	Phthis. pulm. Gallensteine.
166.	K. V.	51 »	55 »	Carcinoma ventriculi.
170.	R. M. 60 »	47 »	125 »	Perniciöse Anaemie. Offenes foramen ovale.
172.	G. Fr. 77 »	29 »	90 »	Marasmus senil. Hydronephros.
174.	H. A. 73 »	43 »	130 »	Carcinoma ventriculi.
175.	M. A. 49 »	48 ¹ / ₂ »	155 »	Phthisis pulmon.

Sectionen aus dem Jahre 1884.

III. Chronische nicht M ä n n l i c h.

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1884.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht	Milz- volumen.	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
98.	F. Fr. 38 J.	70 Kilo	390 gr.	Idiopath. Hypertroph. u. Dilat. d. Herz. Milzhyperplasie.
103.	D. G. 32 »	31 »	145 »	Phthis. pulm. combinat.
105.	G. J. 71 »	55 »	200 »	Cor adipos Atheromatosis.
113.	O. F. 31 »	46 »	215 »	Endocardit. calcul. chronic.
121.	B. J. 34 »	59 »	230 »	Phthis. pulmon. Pneumotho- rax. Milztumor.
126.	S. Fl. 31 »	45 »	220 »	Phthis. pulmon. mit Cavernen.
128.	M. J. 57 »	41 $\frac{1}{2}$ »	390 »	Phthisis pulm. Thromben im Herzen. Milztumor.
130.	Z. J. 42 »	58 »	140 »	Myodegeneratio cordis.
132.	Sp. J. 60 »	42 $\frac{1}{2}$ »	165 »	Phthisis pulmon.
137.	P. J. 22 »	47 $\frac{1}{2}$ »	200 »	Phthis. pulmon. Allg. Lym- phadenitis.
138.	W. F. 53 »	43 »	180 »	Phthis. pulmon. Desquamativ- pneumonie.
144.	T. M. 33 »	62 »	290 »	Hypertroph. cordis. Insuffic. d. Aorta. Stauungsmilz.
145.	P. A. 36 »	43 »	155 »	Phthis. combinat.
147.	A. A. 36 »	59 »	195 »	Phthis. pulm. Thromben im rechten Ventrikel.
151.	V. Gg. 41 »	42 »	100 »	Carcinoma ventriculi.
152.	G. J. 34 »	57 »	200 »	Myodegeneratio cordis.
155.	Sch. J. 27 »	47 »	270 »	Phthis. pulmon. Tuberkulose der Milz.
158.	S. M. 49 »	49 »	165 »	Atheromatos an den Iliacae et rodial. Milzinfarct.
161.	P. Fl. 49 »	75 »	180 »	Hypertroph. et Dilat. cord. Lebercirrhose.
165.	E. Gg. 31 »	72 »	170 »	Myodegeneratio cordis.
168.	A. J. 23 »	53 »	220 »	Phthis. pulmon. Perityphlitis purulent.
169.	L. J. 27 »	67 »	500 »	Phthisis pulm. Hydrops uni- vers. Stauungsmilz.

Gemacht im pathol. Institute zu München.

infectiöse Erkrankungen.

W e i b l i c h .

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1884.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht	Milz- volumen	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
178.	R. A. 61 J.	58 Kilo	220 gr.	Carcin. uteri. Milztumor mit Keilen.
179.	Gr. A. 61 »	52 »	235 »	Endocard. villos. Myodegener. Stauungsmilz.
188.	F. R. 60 »	36 »	105 »	Myocardit. Granularatrophie der Nieren.
194.	N. Fr. 58 »	34 »	140 »	Phthisis pulmon.
195.	A. Fr. 33 »	44 »	160 »	Phthis. pulm. Cavernen. Cirrh.
204.	R. M. 75 »	42 »	160 »	Endocard. fibr. et calcul. Mitral.
207.	Z. Th. 30 »	45 »	285 »	Phthis. comb. mit Cavernen.
208.	L. A. 32 »	39 »	150 »	Phthis. pulmon. combinat.
210.	Sch. F. 69 »	47 »	85 »	Endocard. fibros. retrahens. Embolie in d. Pulmon.
211.	S. H. 63 »	50 »	160 »	Carcinom uteri.
218.	H. L. 43 »	35 »	150 »	Phthis. pulmon. combinat.
220.	B. B. 53 »	58 »	125 »	Endocardit. fibr. et calculos. Hydrops universal.
222.	H. Fr. 54 »	34 »	350 »	Phthis. pulm. Hypertrophie d. Milz u. Leber.
223.	K. Fl. 42 »	38 »	90 »	Phthis. pulmon. combinat.
244.	E. A. 59 »	44 »	205 »	Carcinoma ventriculi.
249.	H. S. 39 »	77 »	210 »	Myodegeneratio cordis.
263.	H. Th. 41 »	37 »	80 »	Phthis. pulm. Peribronch. nod.
266.	D. Fl. 36 »	34 »	170 »	Phthis. pulmon. Fettleber.
269.	P. Cl. 37 »	46 »	165 »	Carcinom. uteri. Allg. Anaem.
286.	W. M. 61 »	25 ¹ / ₂ »	35 »	Atroph. cordis. Offenes foram. oval. Atrophie d. Milz, Leber etc.
296.	H. M. 22 »	37 »	180 »	Phthis. pulm. Pleurit. adhaes.
299.	K. A. 27 »	39 »	160 »	Phthis. pulmon. Cavernen an beiden Lungenspitzen.
308.	J. Fr. 33 »	31 »	205 »	Carcinoma uteri. Fettleber, Milztumor.

Sectionen aus dem Jahre 1884.

III. Chronische nicht

M ä n n l i c h .

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1884.	Name und Alter des Secirten	Körperge- wicht	Milz- volumen	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
177.	S. L. 58 J.	82 K.	175 gr.	Chronische Bleivergiftung.
181.	H. J. 34 »	32 »	270 »	Phthis. pulmon. Atroph. cord.
186.	F. Bl. 30 »	57 »	150 »	Phthisis combin. Wundstän- dige Thromben.
190.	M. M. 58 »	43 »	110 »	Carcinom des Rachens.
191.	S. Fr. 19 »	41 »	215 »	Phthisis pulmon. Milztumor.
198.	F. F. 26 »	47 »	260 »	Phthis. combin. Milztumor.
199.	H. R. 47 »	45 »	140 »	Phthis. comb. Allg. Anaemie.
203.	K. M. 35 »	48 »	240 »	Phthis. pulmon. Milztumor.
209.	A. M. 55 »	78 »	360 »	Myodegenerat. cordis. Milz- stauung.
215.	Sch. L. 48 »	45 »	220 »	Phthis. pulm. Schwellg. d. Milz.
217.	H. M. 61 »	53 »	205 »	Phthis. pulm. Hochgradige Le- bercirrhose.
219.	Sch. F. 64 »	44 »	90 »	Carcinom. ventricul.
224.	H. M. 44 »	60 »	235 »	Hypertroph. cord. Mutkatnuss- leber, Stauungsmilz.
225.	W. K. 57 »	70 »	370 »	Carcinom. d. Kehlkopfs u. der Stimmbänder.
227.	Sp. Th. 36 »	41 »	235 »	Phthis. pulm. Milztumor.
228.	K. Fr. 38 »	62 »	295 »	Phthisis combinat.
230.	H. F. 56 »	40 »	125 »	Endocard. fibr. valvularis re- trahens chronic.
231.	S. J. 22 »	46 »	225 »	Phthis. pulmon.
233.	Sch. A. 37 »	50 »	220 »	Morbus Brightii.
246.	Z. M. 34 »	36 »	220 »	Phthis. pulm. Hydropericard.
247.	St. J. 24 »	50 »	190 »	Phthis. pulmon. combinat.
248.	F. S. 29 »	53 »	425 »	Phthis. pulmon. Milztumor.
252.	St. S. 39 »	40 »	160 »	Phthisis pulmon.
255.	K. A. 42 »	58 »	185 »	Hypertroph. cord. Anthrakosis.
257.	M. W. 18 »	32 »	205 »	Phthis. combinat. Hypoplasio der Aorta.
258.	Th. A. 68 »	41 »	65 »	Cor adiposum. Atrophie der Leber, Milz, Niere, Hoden.

Gemacht im pathol. Institute zu München.

infectiöse Erkrankungen.

W e i b l i c h .

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1884.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht.	Milz- volumen.	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
312.	P. M. 24 J.	38 Kilo	150 gr.	Phthis. pulm. diffuse Cirrhose.
318.	K. J. 65 »	50 »	320 »	Cor adipos. Fettleber, Milz- tumor.
325.	M. F. 57 »	50 »	400 »	Chron. interstitielle Hepatit. Icterus.
335.	M. T. 41 »	44 ¹ / ₂ »	1800 »	Leukaemia lineal. et myelogenä. Milz verwachsen: 26,5 × 15,6 × 5,2.
342.	D. A. 35 »	42 ¹ / ₂ »	220 »	Phthisis pulm. Stauungsmilz, Milz verwachsen.
348.	H. A. 29 »	30 »	130 »	Phthisis pulm. mit Cavernen.
352.	L. Cr. 75 »	27 »	50 »	Phthis. pulmon. Inanitions- atroph. sämmtl. Organe.
366.	Gl. L. 61 »	41 »	55 »	Carcinoma uteri et vagin.
368.	G. M. 70 »	39 »	120 »	Carcinoma uteri et vag. Throm- bus im l. Herzhohr.
372.	M. Fr. 65 »	42 »	110 »	Atheromatose d. aort. abdom. et art. coronat.
383.	N. Th. 73 »	37 »	200 »	Carcinoma port. vagin. uteri. Milztumor.
385.	G. Th. 16 »	24 ¹ / ₂ »	110 »	Phthis. combin. pulmon.
390.	R. K. 69 »	49 »	100 »	Endocardit. calculor.
394.	B. M. 50 »	31 »	170 »	Carcinoma port. vaginal. uteri. Allgem. Anaemie.
397.	D. K. 52 »	25 »	90 »	Phthis. pulm. Stenose d. Pylor.
398.	Sch. M. 43 »	34 »	115 »	Phthis. pulm. Myodegen. cord.
399.	Sch. T. 33 »	48 »	200 »	Phthis. pulmon. mit Cavernen- bildung. Milztumor.
403.	G. H. 25 »	29 »	140 »	Phthis. pulm. Allg. Anämie.
404.	E. R. 46 »	39 »	120 »	Carcinoma port. vaginal. uteri.
424.	B. F. 35 »	49 »	190 »	Carcinoma cervic. uteri.
427.	J. J. 57 »	36 »	110 »	Myodegeneratio cord. Insuffi- cient aort.

Sectionen aus dem Jahre 1884.

III. Chronische nicht M ä n n l i c h .

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1884.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht	Milz- volumen	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
260.	M. A. 38 J.	41 Kilo	155 gr.	Phthisis pulmon.
262.	H. Gg. 18 »	30 »	130 »	Phthis. pulmon.
264.	K. B. 62 »	52 »	310 »	Phthis. pulm. Atheromat. d. Coronararterien.
268.	T. Gg. 38 »	42 »	150 »	Phthis. comb. mit Cavernen- bildung.
271.	M. B. 27 »	48 »	170 »	Phthis. pulm. Atrophia cord.
272.	F. S. 38 »	40 »	315 »	Phthis. pulm. Milztumor.
279.	A. J. 21 »	45 »	265 »	Myodegenerat. cord. Milz u. Nieren-Keile.
282.	M. R. 32 »	47 »	230 »	Phthis. pulm. comb. Schwel- lung d. Milz u. Leber.
284.	Sch. O. 21 »	47 »	125 »	Phthis. pulm. Hydrops inflam- mator.
290.	L. J. 42 »	93 »	230 »	Beiderseit. Schrumpfniere. All- gem. Hydrops.
293.	Str. 37 »	45 »	210 »	Phthis. pulm. Septomeningit. chron. fibros.
294.	W. S. 69 »	73 »	210 »	Hypertroph. et dilatat. cordis. Stauungsorgane.
297.	B. M. 23 »	43 »	170 »	Phthis. pulmon. combinat.
300.	J. A. 53 »	58 »	120 »	Phthis. pulmon. Septomenin- git. fibr. chronic.
301.	K. J. 56 »	59 »	170 »	Carcinom. recti.
303.	Sp. R. 30 »	38 »	185 »	Phthis. combinat. Milztumor.
305.	A. J. 58 »	98 »	365 »	Hypertr. et Lipomatos. cord. Venöse Hyperämie d. Milz.
309.	A. B. 32 »	61 »	210 »	Phthis. pulm. Miliartuberku- lose d. Milz, Leber, Niere.
311.	Z. R. 54 »	33 »	210 »	Phthis. pulmon. Ödema pulm. Milzschwellung.
314.	K. R. 20 »	39 »	140 »	Phthis. pulm. Anaemia cerebr.
315.	R. M. 60 »	45 »	380 »	Carcinom. cardiae. Milztumor, erbsengrosse Nebemilz.

Gemacht im pathol. Institute zu München.

infectiöse Erkrankungen.

W e i b l i c h .

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1884.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht	Milz- volumen	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
428.	H. A. 76 J.	43 K.	525 gr.	Hypertroph. et dilatat. cordis. Stauungsmilz.
440.	W. Th. 71 »	30 »	140 »	Necros. condyl. extern. tibiae. Marasmus.
442.	H. A. 66 »	70 »	110 »	Phthis. pulm. mit Cavernen.
443.	B. M. 24 »	50 »	120 »	Chron. interstit. Nephrit. As- cites.
453.	Sch.C. 63 »	43 »	200 »	Carcinoma ventricul. Schnürr- leber.
458.	M. R. 41 »	75 »	190	Myodegenerat. cord. Schrumpf- niere.
464.	Sch.C. 58 »	43 »	120 »	Carcinom. mammae.
468.	W. V. 32 »	38 »	125 »	Phthisis pulmon. mit Cavernen bildung.
470.	M. Th. 63 »	43 »	150 »	Phthisis pulm. Stauung in Le- ber, Milz, Niere.
474.	Sch.Fl. 73 »	34 »	135 »	Myodegenerat. cordis. Ödema pulmon.
479.	St. P. 61 »	40 »	130 »	Carcinoma pylori.
481.	H. Fl. 62 »	39 »	160 »	Carcinoma pylori.
482.	M. J. 19 »	33 »	165 »	Phthisis pulm. mit Cavernen- bildung.
483.	Sch.R. 73 »	28 »	150 »	Carcinoma uteri. Lungengan- grän.
486.	A. M. 74 »	40 »	150 »	Carcinom des Duodenum.
495.	F. M. 27 »	28 »	105 »	Carcinom. uteri. Blasenmast- darmfistel.
496.	M. R. 25 »	32 »	150 »	Phthis. pulm. mit Cavernen- bildung.
497.	K. A. 59 »	52 »	180 »	Carcinomatose des Abdomens.
500.	D. Th. 53 »	43 »	50 »	Carcinom. ovar.
501.	E. C. 34 »	44 »	119 »	Phthisis pulmon.
507.	B. C. 36 »	45 »	205 »	Phthis. pulm. Fettherz. Fett- leber.

Sectionen aus dem Jahre 1884.

III. Chronische nicht

M ä n n l i c h .

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1884.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht	Milz- volumen	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
316.	F. Fr. 51 J.	45 Kilo	100 gr.	Chalicosis pulm. Ödema pulm.
317.	Sch. R. 58 »	70 »	140 »	Myodegenerat. cordis. Thromben in beiden Herzohren.
319.	W. R. 24 »	40 »	220 »	Phthis. pulmon. Milztumor. Marantische Thromben.
322.	R. J. 30 »	61 »	360 »	Morb. Brightii. Schwellung d. Leber u. Milz.
323.	Ch. M. 20 »	44 »	215 »	Phthisis pulmon.
324.	E. J. 40 »	47 »	330 »	Phthis. pulmon. Stauung in Leber, Milz, Niere.
326.	St. N. 46 »	53 »	200 »	Carcinom. cruris et femor.
329.	St. A. 31 »	65 »	440 »	Phthisis pulmon. Milz- u. Leber-Schwellung.
332.	R. J. 76 »	70 »	115 »	Hypertroph. et dilatat. cordis. Ödema pulmon.
337.	W. J. 40 »	73 »	230 »	Insuffic. u. Stenose. d. Aortaklappen. Stauungsmilz etc.
339.	Kl. E. 61 »	59 »	350 »	Myocardit. et Myodegen. cord. Stauung in Milz u. Leber.
340.	S. A. 19 »	37 »	170 »	Phthisis combinat.
341.	G. M. 23 »	48 »	180 »	Endocardit. verrucos. Thromben im recht. Ventrikel.
345.	W. C. 65 »	61 »	200 »	Idiopathische Hypertroph. u. Dilatation d. Herzens.
353.	C. A. 47 »	37 »	180 »	Phthisis. pulmon. Sclerose d. Coronargefäße.
355.	G. J. 26 »	58 »	365 »	Idiopath. Herz-Hypertrophie. Milz-Hyperplasie.
357.	B. Fr. 42 »	100 »	280 »	Myodegenerat. cord. Stauung in Milz, Leber, Niere.
359.	B. J. 42 »	49 »	255 »	Phthisis pulm. Hydrops ascit.
362.	Sch. J. 21 »	36 »	215 »	Phthis. pulmon mit Cavernenbildung, Milztumor.

Gemacht im pathol. Institute zu München.

infectiöse Erkrankungen.

W e i b l i c h .

Fortlauf. Nr. der Sections berichte 1884.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht.	Milz- volumen.	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
508.	V. B. 69 J.	43 Kilo	115 gr.	Carcinoma uteri.
522.	R. J. 32 »	22 »	80 »	Carcinoma uteri. Phthisis pulmon.
528.	R. M. 56 »	42 »	85 »	Chron. interstit. Nephrit. Milz- atrophie.
540.	L. A. 21 »	35 »	200 »	Phthis. pulm. Fettherz, Milz- tumor.
546.	W. J. 34 »	40 »	145 »	Phthisis combin. Peribronch. purulent.

Sectionen aus dem Jahre 1884.

III. Chronische nicht

M ä n n l i c h .

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1884.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht.	Milz- volumen.	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
364.	W. Fr. 36 J.	53 Kilo	265 gr.	Phthisis pulm. Emphys. pulm.
369.	R. 26 »	41 »	312 »	Phthis. pulm. Embolische Keile in der Milz.
373.	G. Gg. 46 »	70 »	285 »	Myodegener. cord. Stauung in Leber, Milz, Niere.
378.	B. J. 65 »	65 »	100 »	Myzo-angio-Sarcom der basalen Hirnhaut.
382.	St. W. 38 »	40 »	190 »	Phthis. pulm. Cavernen bis zur Orangen-Grösse.
386.	R. A. 52 »	48 »	200 »	Sarcom d. Unterkiefers. Ödema glatt.
391.	H. A. 24 »	58 »	175 »	Chron. Bleivergiftung. Nephrit. parenchymatos.
395.	F. J. 42 »	46 »	285 »	Phthys. pulmon. Milztumor.
401.	B. S. 57 »	46 »	185 »	Necrose d. Sternums, Zerstö- rung d. Claviculargelenks.
406.	K. Gg. 69	42	230 »	Myodegen. cord. Marasm. seril.
410.	L. Fr. 35	58 »	215 »	Endocardit. verruc. et calculos. Hydrops univers.
412.	K. H. 28 »	71 »	295 »	Myodegener. cord. Hyperaemie sämmtlicher Organe.
413.	E. Gg. 47 »	40 »	170 »	Phthis. pulm. Parenchymatöse Schrumpfniere.
415.	K. Fr. 28 »	54 »	195 »	Phthis. pulmon. Perihepatit.
418.	G. F. 51 »	43 »	110 »	Phthis. combinat.
419.	Sch. F. 65 »	54 »	260 »	Endocard. fibr. et calcul. chron. Stauung in Leber, Milz.
420.	H. S. 56 »	35 »	210 »	Caries cost. II u. III.
421.	H. Gg. 27 »	41 »	275 »	Phthisis pulm. Tuberkulos d. Leber, Milz, Niere.
422.	Fr. F. 46 »	45 »	130 »	Phthis. pulmon. mit Cavernen.
425.	B. M. 36 »	42 »	250 »	Myodegenerat. cordis.
430.	F. C. 40 »	37 »	95 »	Beiderseit. Schrumpfnier. Lor- dosis lumbal.

Sectionen aus dem Jahre 1884.

III. Chronische nicht

M ä n n l i c h .

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1884.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht	Milz- volumen	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
438.	W. J. 47 J.	52 Kilo	160 gr.	Chron. Nephrit. Meningit. chron. fibros.
446.	V. A. 30 »	57 »	235 »	Chron. Bleivergiftung. Stau- ungsorgane.
449.	H. H. 41 »	49 »	375 »	Caries femor. et tib. Milzkeil.
451.	Sch. F. 43 »	85 »	420 »	Endocardit. chron. fibr. Stau- ungen in Milz u. Leber.
454.	Sch. F. 32 »	43 »	100 »	Carcinom. recti.
456.	B. M. 25 »	64 »	295 »	Phthis. pulmon. Cavernen.
460.	Sch. R. 67 »	51 »	180 »	Dilatat. et hypertroph. cord. Atheromathosis.
469.	M. Fr. 35 »	51 »	185 »	Phthis. pulmon. Stauung in Leber, Milz.
473.	S. A. 32 »	41 »	115 »	Phthis. combinat. Adhaesiv. Pleuritis.
475.	K. 58 »	58 »	150 »	Endocard. fibr. chron. retrahens.
476.	Z. J. 42 »	36 »	110 »	Carcinoma ventr. (part. pylor).
485.	H. Th. 60 »	44 »	210 »	Carcinoma hepat. ventricul. Schrumpfniere.
488.	P. B. 39 »	46 »	515 »	Phthis. pulmon. Atheromatosis.
489.	Sch. F. 22 »	80 »	440 »	Phthis. pulmon. Fehlen einer Aortaklappe.
490.	D. C. 31 »	38 »	105 »	Phthis. pulmon. Peribronchit. nod. tub.
491.	S. B. 33 »	79 »	290 »	Myodegen. cord. Stauungsmilz.
503.	K. L. 41 »	44 »	170 »	Phthis. pulm. mit zahlreichen Cavernen.
505.	St. J. 48 »	42 »	175 »	Phthis. pulm. Stauung in Le- ber und Milz.
506.	W. A. 51 »	75 »	350 »	Insuffic. u. Stenose der Bi- cuspidalis.
509.	H. J. 37 »	48 »	250 »	Phthis. pulm. Pleurit. adhaes.
510.	Sch. A. 52 »	62 »	200 »	Myodegener. cord. Milzinfarct.

Sectionen aus dem Jahre 1884.

III. Chronische nicht

M ä n n l i c h.

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1884.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht.	Milz- volumen.	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
513.	A. N. 28 J.	49 Kilo	200 gr.	Phthis. pulm. m. Cavernenbldg.
526.	L. L. 28 »	69 »	305 »	Myodegener. cord. Embolischer Milzkeil.
527.	B. F. 51 »	39 »	110 »	Phthis. pulmon. Lebercirrhose.
529.	R. K. 59 »	50 »	220 »	Hypertroph. cord. Granular- atroph. d. Nieren.
545.	L. 52 »	78 »	300 »	Myodegenerat. cord. Stauung in Milz, Leber.
548.	H. M. 57 »	69 »	150 »	Siderosis. Hydrops universal.

Sectionen aus

5.	Sch. 58 »	44 »	170 »	Phthisis pulmon.
7.	St. M. 42 »	82 »	200 »	Idiopathische Hypertroph. et dilat. cordis.
13.	L. B. 58 »	85 »	220 »	Hypertr. et dilat. cord. Embol. Keile in der Milz.
20.	K. Gg. 51 »	58 »	250 »	Phthis. pulm. combinat.
21.	E. J. 29 »	54 »	175 »	Phthis. pulmon.
22.	H. J. 23 »	55 »	460 »	Phthis. combinat. Milz- und Leber-Tumor.
26.	W. J. 28 »	51 »	196 »	Phthis. pulm. m. Cavernenbldg.
27.	Sch G. 35 »	45 »	110 »	Phthis. pulm. m. Cavernenbldg.
31.	S. J. 47 »	54 »	120 »	Phthis. pulmon. mit Cirrhose.
40.	K. A. 70 »	39 »	140 »	Phthis. chronic. Lues.
42.	M. M. 63	60	60	Carcin. ventricul. Lungencirrh.
50.	E. J. 60 »	50 ¹ / ₂ »	150 »	Myocardit. chron. fibr. Aneu- risma d. linken Herzes.
54.	Fl. M. 35 »	34 »	100 »	Kyphoskoliosis d. Brustwirbel- säule, Lungenödem.
55.	S. Gg. 30 »	44 »	290 »	Phthis. pulm. floride Cavernen. Milztumor.
59.	M. J. 28 »	33 »	170 »	Phthis. pulm. m. Cavernenbild.

Gemacht im pathol. Institute zu München.

infectiöse Erkrankungen.

W e i b l i c h .

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1885.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht	Milz- volumen	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
---	------------------------------------	--------------------	------------------	---

dem Jahre 1885.

6.	R. M. 42 J.	31 $\frac{1}{2}$ K.	230 gr.	Phthis. pulm. Fettleber, Stauungsmilz.
8.	H. A. 81 »	36 »	150 »	Myodegenerat. cord. Niereninduration.
16.	B. M. 42 »	58 »	430 »	Endocardit. chronic. Stauungsorgane.
25.	Sch. M. 54 »	81 »	140 »	Myodegenerat. cord. Arteriosclerose d. Aorta.
33.	F. Th. 38 »	31 »	194 »	Phthis. pulm. Perisplenit. Perihepat.
47.	K. Cr. 42 »	39 »	270 »	Phthis. pulmon. Milztumor.
48.	S. M. 66 »	38 »	110 »	Endocardit. chronic. fibros. Alte Syphilis.
52.	M. A. 31 »	35 »	110 »	Phthis. pulmon. combinat.
53.	St. A. 65 »	45 »	110 »	Bedeutende Hypertrophie d. Ventrikel.
58.	J. M. 34 »	38 »	90 »	Phthis. pulmon.
60.	D. Fr. 67 »	42 »	65 »	Insufficienz d. Tricuspidalis, Atrophie d. Milz u. Nieren
76.	E. Fl. 64 »	40 »	120 »	Carcinom. pylori. et hepat.
81.	B. B. 57 »	50 »	190 »	Phthis. pulm. Hypertroph. cord.

Sectionen aus dem Jahre 1885.

III. Chronische nicht

M ä n n l i c h.

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1885.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht.	Milz- volumen.	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
65.	R. J. 33 J.	59 Kilo	195 gr.	Phthis. pulm. Hypertrophie d. Ventrikel.
67.	F. Gg. 33 »	53 »	260 »	Phthis. pulm. Milztumor, Stau- ungsleber.
68.	M. A. 35 »	32 »	70 »	Carcinoma ventricul. Atrophie sämmtl. Organe.
75.	St. P. 51 »	51 »	170 »	Phthis. pulm. Adhaesivpleurit.
80.	W. J. 45 »	52 »	190 »	Phthisis pulm. Caries cosae.
82.	K. J. 65 »	35 »	150 »	Carcinoma pylori.
89.	B. P. 81 »	41 »	145 »	Endocardit. chron. Milzkeile.
94.	M. J. 35 »	35 »	110 »	Phthisis pulm. Pneumothorax.
95.	J. J. 56 »	52 »	190 »	Chalikosis pulmon.
104.	M. Gg. 71 »	43 »	150 »	Carcin. ventric. Lungencirrhos
108.	Sch. G. 42 »	77 »	127 »	Idiopath. Hypertroph. d. Herz.
112.	W. Fr. 31 »	50 »	200 »	Phthis. pulmon. Pleurit. ad- haes. chron.
117.	D. J. 18 »	48 »	210 »	Phthis. pulm. mit Cavernen.
122.	Sch. L. 40 »	55 »	260 »	Phthisis pulm. Pleurit. adhaes chron.
124.	B. M. 57 »	68 »	165 »	Idiopathische Hypertrophie u. Dilat. des Herzens.

Gemacht im pathol. Institute zu München.

infectiöse Erkrankungen.

W e i b l i c h .

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1885.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht.	Milz- volumen.	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
83.	H. M. 78 J.	32 Kilo	50 gr.	Stenose der Mitralis. Atroph. sämmtl. Organe.
84.	L. M. 53 »	48 »	155 »	Granularatrophie der Nieren. Hydronephrose.
86.	G. A. 80 »	56 »	67 »	Carcinoma cervic. uteri. Gan- graena pulmon.
92.	F. B. 60 »	42 »	55 »	Carcinom. pylori. Atrophie d. Organe.
103.	D. M. 47 »	39 »	120 »	Phth. pulm. Endarteriitis aort.
111.	H. M. 22 »	34 »	145 »	Phthis. pulm. mit Cavernenbild.
121.	P. V. 61 »	47 »	60 »	Sarkomatose des Peritoneums.
123.	F. Th. 31 »	48 »	440 »	Insufficienz der Aorta durch Verwachsung zweier Semi- nurklappen. Stauungsmilz.

Sectionen aus dem Jahre 1883.

IV. Gewaltsame

M ä n n l i c h.

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1883.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht	Milz- volumen.	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
249.	A. Th. 27 J.	68 Kilo	105 gr.	Schussverletzung in's Gehirn.
546.	Männl. Cad.	43 $\frac{1}{4}$ »	110 »	Tod durch Ertrinken.
552.	N. M. 53 »	100 »	205 »	Durchschneidung d. art. brach. u. radial.
595.	B.	76 »	180 »	Tod durch Ertrinken.
596.	B. G. 28 »	88 »	280 »	Schussverletzung durch d. rech- ten Schläfenlappen.

Sectionen aus

45.	E. R. 21 »	60 »	150 »	Schussverletzg. des Gehirns.	
49.	G. Fr. 50 »	59 »	125 »	Schussverletzg. des Gehirns und der Medulla.	
53.	K. B. 29 »	67 »	280 »	Schussverl. in's Herz. Stauung i. d. Milz, kirschengr. Nebenm.	
54.	Sch. A. 52 »	65 »	80 »	Tod durch Ertrinken.	
104.	J. H. 42 »	55 »	110 »	Tod durch Ertrinken.	
112.	H. Fr. 34 »	54 »	175 »	Vergiftung mit Cyankali.	
125.	Sch. F. 60 »	43 »	290 »	Schussverl. i. Herz. Milztumor.	
200.		93 »	200 »	Tod durch Erhängen.	
213.	B. L. 23 »	66 »	175 »	Schussverl. ins Gehirn. Perispl.	
239.	B. A. 53 »	91 »	110 »	Tod durch Erhängen.	
376.	B. A. 14 »	27 »	75 »	Tod durch Ertrinken.	
405.	Sch. R. 23 »	53 »	180 »	Tod durch Erschiessen.	
516.	M. 45 »	60 »	95 »	Tod d. Ueberfahren d. Eisenb.	
517.	B. 33 »	62 »	130 »	Schussverletzung ins Gehirn.	
532.		30 »	55 »	260 »	Tod durch Erhängen.

Sectionen aus

24.	P. F. 18 »	52 »	90 »	Tod durch Ertrinken.
43.	B. A. 53 »	72 »	175 »	Schuss durch den 6. Interco- stalraum.
72.	W. R. 24 »	65 »	140 »	Schussverletzung des Gehirns.
107.	Sch. L. 17 »	54 »	140 »	Tod durch Ertrinken.

Gemacht im pathol. Institute zu München.

Todesfälle.

Weiblich.

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1883.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht.	Milz- volumen.	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
615.	W. O. 17 J. 48 $\frac{1}{2}$ K.	125 gr.		Phosphorvergiftung.

dem Jahre 1884.

37.		47 $\frac{1}{2}$ »	150 »	Tod durch Ertrinken.
41.		58 $\frac{1}{2}$ »	125 »	Tod durch Ertrinken.
75.	Sch. S. 16 »	55 »	200 »	Phosphorvergiftung. Allgem. Icterus.
216.	G. J. 53 »	46 $\frac{1}{2}$ »	180 »	Tod durch Ertrinken.
306.	Z. M. 36 »	44 »	125 »	Zertrümmerung des Schädels durch Sturz.
396.	N. J. 15 »	44 «	210 »	Tod durch Ertrinken. Milz- tumor.
547.	A. M. 45 »	49 »	70 »	Tod durch Ertrinken.

dem Jahre 1885.

--	--	--	--	--

K i n d e r.

Sectionen aus dem Jahre 1883.

I. Infections-**M ä n n l i c h.**

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1883.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht	Milz- volumen	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
106.	L. L. 1 $\frac{1}{2}$ J.	7 $\frac{1}{2}$ K.	45 gr.	Morbilli.
219.	H. H. 7 $\frac{3}{4}$ »	13 »	45 »	Diphtheria faucium.
225.	H. J. 2 »	10 »	90 »	Diphtherie des Rachens, Croup d. Larynx.
332.	B. H. 1 $\frac{1}{2}$ »	8 »	40 »	Diphth. fauc. Pneum. croupos.
347.	W. A. 3 $\frac{1}{4}$ »	12 »	55 »	Diphther. Pneumon. croupos.
361.	S. Gg. 2 »	10 »	50 »	Morbilli. Bronchopneumon.
374.	B. J. 1 $\frac{1}{2}$ »	6 $\frac{1}{2}$ »	40 »	Lues.
387.	S. J. 1 $\frac{3}{4}$ »	9 »	50 »	Morbilli. lobul. Pneumonie.
396.	Tr. J. 4 »	13 $\frac{1}{2}$ »	60 »	Diphtheria avulae, fousill. fa- cium et larynx.
415.	G. A. 1 $\frac{3}{4}$ »	11 »	55 »	Diphtheria.
417.	M. R. 4 »	14 »	90 »	Diphtheria.
426.	A. J. 2 »	9 »	44 »	Diphther. Pharynx et Larynx.
440.	A. L. 4 »	11 $\frac{1}{2}$ »	75 »	Diphther. Pharynx et Larynx.
450.	S. J. 1 $\frac{3}{4}$ »	7 $\frac{1}{2}$ »	45 »	Diphther. Pharynx, Larynx et Trach.
491.	Fr. J. 4 »	14 »	55 »	Diphther.
535.	M. M. 2 »	8,5 »	50 »	Morbilli.
579.	H. J. 2 »	13 »	70 »	Diphtheria.
638.	R. J. 1 »	8 »	45 »	Morbilli. pneumon. catarrh.

Sectionen aus

1.	B. J. 3 »	12 $\frac{1}{2}$ »	80 »	Morbilli. Milzembolie. Lobul. Pneumon.
47.	M. A. 3 $\frac{1}{2}$ »	10 »	38 »	Diphtheria faucium.
73.	R. F. 6 $\frac{1}{2}$ »	19 »	100 »	Diphther. faucium. Embol. Milz- keile.
140.	E. R. 8 »	18 »	80 »	Angin. diphtherit.
267.	Sch. M. 2 »	6 $\frac{1}{2}$ »	45 »	Ang diphtherit. Herzatrophie.
447.	G. E. 4 »	15 »	68 »	Angin. diphther. Lungenem- physem.

K i n d e r.

Gemacht im pathol. Institute zu München.

Krankheiten.

W e i b l i c h.

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1883.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht	Milz volumen	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
70.	R. M. 13 M.	6 Kilo	35 gr.	Morbilli. Pneumon.
93.	F. B. 2 $\frac{1}{2}$ J.	9 $\frac{1}{2}$ »	40 »	Ang. diphtherit.
113.	L. M. 4 $\frac{1}{2}$ »	11 »	45 »	Morbilli. Pleuropneumon.
167.	F. M. 4 »	8 $\frac{1}{2}$ »	35 »	Morbilli. Käsigc Spitzenaffec- tion beiderseits.
256.	F. M. 1 $\frac{1}{4}$ »	5 $\frac{1}{2}$ »	20 »	Morbilli.
260.	H. R. 4 »	17 »	60 »	Diphther. Laryngo - tracheo- bronchit. croupos.
324.	M. A. 2 »	8 $\frac{1}{2}$ »	45 »	Morbilli. Croup. d. Pharynx.
343.	N. B. 1 »	14 $\frac{1}{2}$ »	45 »	Diphther.
400.	E. R. 3 »	11 $\frac{1}{2}$ »	85 »	Morbilli.
402.	S. Th. 4 »	13 »	80 »	Morbilli. Lobul. Pneumon.
508.	H. A. 11 »	26 $\frac{1}{2}$ »	270 »	Typh. abdom. Ende der 11. Woche.
514.	H. M. 5 »	13 »	60 »	Angin. diphtherit.
587.	H. Cr. 2 »	10 »	75 »	Diphther. faucium.
609.	B. M. 1 $\frac{1}{4}$ »	8 »	40 »	Diphtheria.

dem Jahre 1884.

35.	G. A. 3 $\frac{3}{4}$ »	11 »	55 »	Angin. diphtherit.
64.	B. F. 3 $\frac{3}{4}$ »	13 »	65 »	Angin. et laryngotracheitis diphtherit.
131.	E. R. 9 »	17 »	65 »	Angina diphtheritica.
150.	H. M. 5 »	13 »	120 »	Scarlatina, Milztumor. Lun- gen- und Gehirn-Ödem.
164.	S. M. 1 $\frac{1}{2}$ »	6 »	70 »	Diphther. faucium.
167.	S. B. 4 »	10 »	55 »	Morbilli.
189.	F. F. 6 »	15 $\frac{1}{2}$ »	60 »	Ang. diphther. Pleur sero fibr.

Sectionen aus dem Jahre 1884.

I. Infections-

M ä n n l i c h.

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1884.	Name und Alter des Secirten	Körperge- wicht	Milz- volumen	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
471.	D. J. 3 J. 12	K.	45 gr.	Laryngo-tracheit. diphtherit.
498.	K. J. 3 » 10	»	73 »	Ang. diphtherit. Ödem d. Ary- epiglott. Falten.

Sectionen aus

32.	A. Chr. 7 »	15 »	40 »	Diphtheria.
79.	L. L. 3 »	14 »	55 »	Diphtheria.
109.	Fr. L. 1 »	6 »	37 »	Diphtheria faucium.
187.	F. A. 4 ¹ / ₂ »	14 »	73 »	Diphtheria faucium.

Gemacht im pathol. Institute zu München.

Krankheiten.

W e i b l i c h.

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1884.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht.	Milz- volumen	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
240.	L. M. 5 J.	9 Kilo	40 gr.	Diphtheria faucium.
253.	R. M. 5 »	14 »	45 »	Diphtheria.
254.	P. M. 3 »	14 »	50 »	Laryngitis diphtherit. Milz- tumor.
277.	M.F. 1 1/2 »	8 1/2 »	25 »	Sepsis post Amputation. femor.
374.	St.R. 1 1/4 »	7 1/2 »	45 »	Laryngo-tracheitis. diphtherit.
502.	L. F. 2 1/2 »	12 »	40 »	Diphtheritis.

dem Jahre 1885.

70.	Sch. D. 6 »	13 »	45 »	Diphtheria faucium.
90.	Pf. W.	9 »	45 »	Diphtheritis.

Sectionen aus dem Jahre 1883.

II. Acute nicht

M ä n n l i c h.

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1883.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht.	Milz- volumen.	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
73.	S. S. 1 $\frac{1}{2}$ J.	8 $\frac{1}{2}$ K.	55 gr.	Bronchit et Peribronch. puru- lent.
85.	W. J. 6 $\frac{3}{4}$ »	18 $\frac{1}{2}$ »	160 »	Combustio.
124.	Gl. 1 »	10 »	20 »	Pneumonie beider Unterlappen.
185.	Sch. B. 1 »	6 »	16 »	Meningitis basilar. Hydroceph. int. Acutr.
206.	E. J. 1 »	6 $\frac{1}{2}$ »	25 »	Bronchopneumon. acut. post Morbill.
265.	S. J. 1 $\frac{3}{4}$ »	7 $\frac{1}{2}$ »	40 »	Pneumon. croupos. Gerade He- patisat.
316.	W. A. 4 »	17 $\frac{1}{2}$ »	50 »	Combustgrad I u. II.
329.	K. S. 6 W.	2,5 »	7 »	Debilitas vitae.
345.	S. J. 1 $\frac{1}{4}$ J.	7 »	30 »	Pleurit et Peritonit purulent.
364.	F. J. 1 $\frac{1}{2}$ »	7 $\frac{1}{2}$ »	66 »	Bronchopneumon.
369.	B. A. 4 »	12 $\frac{1}{2}$ »	100 »	Croupöse Pharyngo-Laryngo- Tracheitis.
372.	J. R. 1 »	7 »	111 »	Pneumon. Croup. Larynx.
377.	F. A. 2 »	8 »	42 »	Pneumon. lobul. Gastrit. croup.
383.	G. J. 3 »	11 »	80 »	Pneumon. lobular. Adhaesiv- pleurit.
398.	G. J. 5 »	14 »	48 »	Bronchopneumon. Hyperaemia cerebri.
438.	S. T. 1 $\frac{3}{4}$ »	9 $\frac{1}{2}$ »	40 »	Pneumon. croupos.
492.	W. Fr. 5 »	12 »	60 »	Bronchopneumonie.
569.	W. B. 1 »	7 »	25 »	Croupöse Pleuropneumon.

Sectionen aus

68.	G. M. 2 $\frac{3}{4}$ »	9 »	45 »	Basilarmeningit.
81.	B. J. 5 $\frac{1}{4}$ »	26 »	180 »	Pleurit. et Peritonit. purulent.
109.	S. J. 6 $\frac{3}{4}$ »	14 $\frac{1}{2}$ »	50 »	Peribronchit. caseos.

Gemacht im pathol. Institute zu München.

infectiöse Erkrankungen.

W e i b l i c h .

Fortlauf. Nr. des Sections- berichtes 1883	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht.	Milz- volumen	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
202.	W. M. 6 J.	13 $\frac{1}{2}$ K.	40 gr.	Acute Basilarmeningitis.
257.	N. Th. 3 $\frac{1}{4}$ »	11 $\frac{1}{2}$ »	30 »	Peritonit. diffus.
269.	Sp. M. 3 $\frac{3}{4}$ »	4 »	16 »	Pachymeningit int. et Lepto- mening. pur.
270.	W. M. 3 $\frac{1}{4}$ »	8 »	40 »	Acute Miliartuberkul. pulm. et pleur.
273.	Sch. M. 5 »	12 $\frac{1}{2}$ »	55 »	Pneumon. lobular.
293.	T. A. 4 »	11 $\frac{1}{2}$ »	30 »	Pneumon. lobul.
295.	M. B. 5 »	13 »	44 »	Pneumon. catarrhal. et croupos.
304.	Sp. A. 1 »	8 »	28 »	Pneumon. lobular.
309.	Z. B. 10 »	21 »	60 »	Perforatio peritonitis.
313.	B. A. 3 »	8 $\frac{1}{2}$ »	10 »	Pneumon. croupos.
333.	S. N. 1 $\frac{1}{4}$ »	7 »	60 »	Pneumon. croupos.
335.	G. M. 6 »	13 »	30 »	Pneumon. lobul.
362.	L. M. 1 »	7 »	20 »	Pneumon. croupos.
366.	D. H. 13 »	22 $\frac{1}{2}$ »	65 »	Basilar u. Convexitäts-Mening.
367.	K. F. 5 »	11 »	64 »	Basilarmening. Hydroceph. int.
370.	B. B. 2 »	8 »	50 »	Lobular-Pneumon. post Morb.
385.	V. Th. 3 »	14 »	35 »	Pneumon. lobul. Emphympur.
409.	Sch. R. 2 »	13 »	70 »	Combustgrad I u. II.
423.	B. F. 1 »	6 »	18 »	Bronchit. Pneumon. lobul. in- cipiens.
460.	K. F. 20 M.	7 $\frac{1}{2}$ »	27 »	Bronchopneumon.
475.	M. F. 6 J.	16 »	85 »	Pneumon. lobul. Croupos. La- ryngit.
559.	L. Th. 4 »	10 $\frac{1}{2}$ »	60 »	Bronchopneumon. purulent.
605.	H. A. 14 »	25 $\frac{1}{2}$ »	78 »	Pleuritis fibrino-purul. Caries.
632.	B. Th. 3 Tg.	1,500 »	30 »	Apoplex. cerebr. Icter. neonat.

dem Jahre 1884.

24.	H. C. 3 J.	8 $\frac{1}{2}$ »	80 »	Pronchopneumonie post Morbil.
31.	G. J. 1 $\frac{1}{2}$ »	8 $\frac{1}{2}$ »	75 »	Laryngit. fibrinos, Stenose d. Stimmritze.

Sectionen aus dem Jahre 1884.

II. Acute nicht

M ä n n l i c h.

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1884.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht	Milz- volumen	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
127.	M. J. 11 J.	21 Kilo	185 gr.	Croupös. Pleuropneumon. Milz- tumor.
133.	Fr. J. 2 »	6 »	45 »	Bronchit. Atelectase d. Lungen.
400.	B. J. 11 »	24 »	130 »	Peritonit. purulent. Fäulniss in Lunge, Milz etc.
435.	H. J. 6 »	20 »	80 »	Schädelbruch.
448.	Kr. J. 4	12 »	45 »	Basilarmeningit. Miliartuberk.

Sectionen aus

116.	M. Fr. 4 »	11 »	95 »	Acute allgem. Miliartuberkul.
125.	M. J. 1 »	6 »	14 »	Meningit. basil. tuberkul.
139.	K. Fr. 3 »	14 »	70 »	Pneumon. lobular.
150.	Sch. H. 3 »	16 »	120 »	Pneumon. lobul. Pleur. fibrin.
161.	G. M. 3 ³ / ₄ »	9 »	86 »	Meningit. tuberkul.
167.	H. J. 2 ¹ / ₂ »	10 »	120 »	Bronchopneumon.

Gemacht im pathol. Institute zu München.

infectiöse Erkrankungen.

W e i b l i c h .

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1884.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht	Milz- volumen	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
149.	S. P. 6 J.	17 Kilo	85 gr.	Basilarmeningit.
205.	L. M. 3 »	10 »	50 »	Pleuritis serofibrinos bilateral.
206.	S. A. 5 »	15 »	60 »	Pneumon. lobular. Emphysem.
221.	H. A. 1 1/2 »	8 »	35 »	Bronchopneumon. catarrh. bi- lateral.
307.	F. J. 11 »	28 »	65 »	Pericardit. fibrin. Obliteration d. Herzbeutels.
330.	W. Th. 8 »	21 »	50 »	Pleurit. tuberkul. Stauung in Leber und Milz.
389.	H. R. 2 »	9 »	25 »	Pneumon. croupous.
472.	V. A. 5 »	11 »	72 »	Pneumon. croup. Meningit.
472.	M. F. 2 »	6 »	30 »	Kaesige Pneumon. De cubitus.
480.	M. P. 8 »	18 »	118 »	Pneumon. croupous. Fettdege- nerat d. Herzens.
487.	G. A. 11 »	28 »	120 »	Pericardit. sero-fibrin. Hydro- thorax.

dem Jahre 1885.

78.	G. A. 6 »	14 »	40 »	Bronchopneumonie.
91.	M. Fr. 11 »	21 »	65 »	Meningit. basil. Miliartuberk.
119.	K. Th. 1 »	5 »	25 »	Pneumon. lobul.
183.	W. J. 3 1/2 »	10 »	60 »	Pleurit. serofibrin.

Sectionen aus dem Jahre 1883.

III. Chronische nicht

M ä n n l i c h.

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1883.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht	Milz- volumen	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
129.	P. Fr. 7 »	11 Kilo	60 gr.	Caries I Brustwirbel.
227.	Sch. F. 3 »	11 ¹ / ₂ »	35 »	Myocarditis. Hypertroph. et dilat. cordis.
252.	Sch. M. 5 »	10 ¹ / ₂ »	40 »	Sarkom in der Orbiter.
468.	K. R. 2 ¹ / ₂ »	8 ¹ / ₂ »	90 »	Phthis. pulm. mit Cavernen.
600.	St. J. 10 »	22 ¹ / ₂ »	85 »	Caries d. Oberkiefers. Noma.

Sectionen aus

117.	W. J. 3 »	8 »	50 »	Phthis. combinat. Caries co- lumn. dorsal.
281.	M. F. 2 »	6 »	40 »	Phthis. pulmon. Tuberkulose der Leber, Milz, Niere.

Sectionen aus

45.	G Fr. 11	23 »	75 »	Endocardit. verrucos. Hydrops universal.
46.	E. J 10	20 »	125	Cositis sinist. caseosa Dila- tat. cordis

Gemacht im pathol. Institute zu München.

infectiöse Erkrankungen.

W e i b l i c h .

Fortlauf. Nr. der Sections- berichte 1883.	Name und Alter des Secirten.	Körperge- wicht	Milz- volumen	Name der Krankheit und allenfallsige Bemerkungen
127.	S. M. 2 ¹ / ₄ J.	4 ¹ / ₂ K.	45 gr.	Phthisis combinat.
259.	D. Fr. 11 M.	1,5 »	7,5 »	Allgem. hochgrad. Atrophie.

dem Jahre 1884.

20.	S. B. 2 ³ / ₄ J.	12 »	20 »	Anaemie. Fettdegeneration d. Herzens.
50.	A. M. 3 ³ / ₄ »	9 »	75 »	Phthis. combinat.
67.	H. F. 4 ³ / ₄ »	9 ¹ / ₂ »	80 »	Caries coxae. Hochgradige Ab- magerung.
111.	P. C. 6 ¹ / ₂ »	12 ¹ / ₂ »	55 »	Otitis purulent. int. Caries d. Felsenbeins.
285.	H. S. 15 »	28 »	80 »	Phthis. pulm. Anämie d. Milz und Leber.
384.	H. R. 1 ³ / ₄ »	6 »	25 »	Phthis. pulmon. Pericardit. purulent.

dem Jahre 1885.

38.	L. J. 2 »	6 »	100 »	Rachitis. Milztumoa.
-----	-----------	-----	-------	----------------------



